

ホワイトローション

【処方】

タルク（局）	150g
酸化亜鉛（局）	150g
グリセリン（局）	200mL
5%ベントナイト液（自家製剤）	600mL
20%ヒビテングルコネート(大日本住友)	3mL
RO水	100mL
<hr/>	
全量	1200mL

- 【準備】・ メートルグラス、攪拌棒、おたま、ロート、ゴムベラ、スパーテルを用意する。
- ・ らい播潰機を動かす準備をする。

【製法】 1) 調製法

- ① 播潰機にタルクと酸化亜鉛をいれ、そこにグリセリンを泥状となる様に研和しながら加え（約 150mL 弱）、20 分間研和する。
 - * グリセリンは少なすぎると塊ができてしまい、上手く混ざらなくなる。また多すぎるとよく研和できない為、様子を見ながら注意して行う。（まず 125mL 加え、後は様子を見ながら加えると良い。）
- ② 研和終了後、残りのグリセリン、5%ベントナイト液、RO水の順に攪拌しながら、少しずつ加える。
- ③ 最後に 20%ヒビテングルコネート液を加え 30 秒間攪拌し、すぐにおたま、ロートを使って容器に充填して製する。
 - * 20%ヒビテングルコネート液を加えた後、長時間攪拌を続けると泥状になってしまう事があるので、均一になったらすぐに攪拌をやめる。
 - * 放置すると分離するので、攪拌終了後直ちに容器に移す。

【貯法】 容 器：分類（気密容器）、払い出し容器（透明外用ポリ瓶）

使用期限：調製年月日（小分け：3ヶ月）

保存条件：室温保存、用時振盪