

診療科 血液腫瘍内科		分類 リンパ腫		1 / 1						
レジメンNo. 09-IG048		休薬期間 16日		最大回数 8回						
レジメン名称 CHOP療法										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	末梢静脈側管 点滴静注で 全開で グラニセトロン静注液(3mg-3mL) [カイトル] 生理食塩液PL(フソー) 50mL	1A 1瓶		10:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 全開で オンコビン(1mg) 生理食塩液PL(フソー) 50mL	1.4mg 1瓶	/m ²	11:00						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 30分かけて アドリアシン注用(10mg) 5%ブドウ糖液 50mL	50mg 1瓶	/m ²	11:10						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 180分かけて 注射用エンドキサン「500mg」 生理食塩液PL(フソー) 500mL	750mg 1瓶	/m ²	11:40						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50mL フラッシュ	1瓶		14:40						
01	プレドニン錠[プレドニゾン](5mg) 食後:朝8昼6夕6	20	T 5日分	●	→	→	→	→		
―― 終了 ――										
レジメンNo. 09-IG048 レジメン名称 CHOP療法 レジメン参照情報 【併用薬】 ・PSL:100mg/day day1-5										
レジメンコメント(医師専用)										