

診療科 血液腫瘍内科		分類 リンパ 腫		1 / 1						
レジメンNo. 09-IG049		休薬期間 16日		最大回数 8回						
レジメン名称 COP療法										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	末梢静脈側管 点滴静注で グラニセトロン静注液 (3mg-3mL) [カイトリル] 生理食塩液PL (フソー) 50mL	1A 1瓶		10:30						
02	末梢静脈側管 点滴静注で オンコピン (1mg) 生理食塩液PL (フソー) 50mL	1.4mg 1瓶	/m ²	11:00						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 120分かけて 注射用エンドキサン「500mg」 生理食塩液PL (フソー) 500mL	750mg 1瓶	/m ²	11:10						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) 50mL フラッシュ	1瓶		13:10						
01	プレドニン錠 [7'レド'ニ'ロ] (5mg) 食後：朝8 昼6 夕6	20	T 5日分	●	→	→	→	→		
―― 終了 ――										
レジメンNo.	09-IG049									
レジメン名称	COP療法									
レジメン参照情報										
【併用薬】 ・PSL:100mg/day day1-5										
レジメンコメント(医師専用)										