

診療科 血液腫瘍内科		分類 MM		1 / 4						
レジメンNo. 17-IG0152		休薬期間 6日		最大回数 1回						
レジメン名称		★ELd療法(1サイクル)								
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL(フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/15分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カ'ロン] ガスター注射液「20mg-2mL」 生理食塩液PL(フソー) 50ml	1瓶 1A 1瓶		09:30						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 133ml/h/45分かけて 生理食塩液PL(フソー) 100ml	1瓶		09:45						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 投与速度の詳細は、レ'の参照情報を参照。 エムプリシディ点滴静注用「400mg」 300mgは13mL、400mgは17mLの注射用水で溶解。 注射用水 100ml 生理食塩液ソフトバ'ック(大塚) 250ml 初回30mL/h、2回目180mL/h、3回目以降300mL/hで開始。インラインフィルターを用。	10mg /kg 1瓶 230mL		10:30						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		13:15						
続きあり										
レジメンコメント(医師専用)										

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

2 / 4

レジメンNo. 17-IG0152

休薬期間 6日

最大回数 1回

レジメン名称 ★ELd療法(1サイクル)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL (フソー) ルートキープ	100ml	1瓶	09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/15 分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」 [デ'カ'ロン] ガスター注射液「20mg-2mL」 生理食塩液PL (フソー) 50ml		1瓶 1A 1瓶	09:30						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 133ml/h/45 分かけて 生理食塩液PL (フソー) 100ml		1瓶	09:45						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 投与速度の詳細は、レジメン参照情報を参照。 エムブリシティ点滴静注用「400mg」 300mgは13mL、400mgは17mLの注射用水で溶解。 注射用水 100ml 生理食塩液ソフトバッグ (大塚) 250ml 初回30mL/h、2回目180mL/h、3回目以降300mL/hで開始。インラインフィルターを用。	10mg	/kg 1瓶 230mL	10:30						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) 50ml フラッシュ		1瓶	11:45						
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

3 / 4

レジメンNo. 17-IG0152

休薬期間 6日

最大回数 1回

レジメン名称 ★ELd療法(1サイクル)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(15)	day(16)	day(17)	day(18)	day(19)	day(20)	day(21)
01	持続末梢静脈維持ルートから 生理食塩液PL(フソー) 100ml ルートキープ	100ml	1瓶	09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/15分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カ'ロン] ガスター注射液「20mg-2mL」 生理食塩液PL(フソー) 50ml		1瓶 1A 1瓶	09:30						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 133ml/h/45分かけて 生理食塩液PL(フソー) 100ml		1瓶	09:45						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 投与速度の詳細は、レジメン参照情報を参照。 エムプリシティ点滴静注用「400mg」 300mgは13mL、400mgは17mLの注射用水で溶解。 注射用水 100ml 生理食塩液ソフトバッグ(大塚) 250ml 初回30mL/h、2回目180mL/h、3回目以降300mL/hで開始。インラインフィルターを用。		10mg /kg 1瓶 230mL	10:30						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ		1瓶	11:25						
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 血液腫瘍内科		分類 MM		4 / 4							
レジメンNo. 17-IG0152		休薬期間 6日		最大回数 1回							
レジメン名称		★ELd療法(1サイクル)									
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(22)	day(23)	day(24)	day(25)	day(26)	day(27)	day(28)	
01	持続末梢静脈維持ルートから 生理食塩液PL(フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		09:00							
02	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/15分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カド'ロン] ガスター注射液「20mg-2mL」 生理食塩液PL(フソー) 50ml	1瓶 1A 1瓶		09:30							
03	末梢静脈側管 点滴静注で 133ml/h/45分かけて 生理食塩液PL(フソー) 100ml	1瓶		09:45							
04	末梢静脈側管 点滴静注で 投与速度の詳細は、レジメン参照情報を参照。 エムプリシティ点滴静注用「400mg」 300mgは13mL、400mgは17mLの注射用水で溶解。 注射用水 100ml 生理食塩液ワトバ'グ'(大塚) 250ml 初回30mL/h、2回目180mL/h、3回目以降300mL/hで開始。インラインフィルターを用。	10mg/kg 1瓶 230ml		10:30							
05	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		11:25							
終了											
レジメンNo.	17-IG0152										
レジメン名称	★ELd療法(1サイクル)										
レジメン参照情報											
【併用薬】 (前投薬) ・デキサメタゾン錠:28mg/day day1.8.15.22 (Elotuzumab投与 3〜24時間前) ・アセトアミノフェン錠:600mg day1.8.15.22 (Elotuzumab投与30〜90分前) ・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩:2mg day1.8.15.22 (Elotuzumab投与30〜90分前) (治療薬) ・レナリドミド:25mg/day day1-21											
レジメンコメント(医師専用)											

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

1 / 4

レジメンNo. 17-IG0153

休薬期間 6日

最大回数 1回

レジメン名称 ★ELd療法(2サイクル)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	持続末梢静脈維持ルートから 生理食塩液PL(フソー) 100ml ルートキープ		1瓶	09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/15分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カ'ロン] ガスター注射液「20mg-2mL」 生理食塩液PL(フソー) 50ml		1瓶 1A 1瓶	09:30						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 133ml/h/45分かけて 生理食塩液PL(フソー) 100ml		1瓶	09:45						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 投与速度の詳細は、レ'ミ'ン参照情報を参照。 エムプリシティ点滴静注用「400mg」 300mgは13mL、400mgは17mLの注射用水で溶解。 注射用水 100ml 生理食塩液ソフトバック(大塚) 250ml 初回30mL/h、2回目180mL/h、3回目以降300mL/hで開始。インラインフィルターを用。		10mg /kg 1瓶 230mL	10:30						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ		1瓶	11:25						
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

2 / 4

レジメンNo. 17-IG0153

休薬期間 6日

最大回数 1回

レジメン名称 ★ELd療法(2サイクル)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL(フソー) 100ml ルートキープ		1瓶	09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/15分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デカトロン] ガスター注射液「20mg-2mL」 生理食塩液PL(フソー) 50ml		1瓶 1A 1瓶	09:30						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 133ml/h/45分かけて 生理食塩液PL(フソー) 100ml		1瓶	09:45						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 投与速度の詳細は、レジメン参照情報を参照。 エムプリシティ点滴静注用「400mg」 300mgは13mL、400mgは17mLの注射用水で溶解。 注射用水 100ml 生理食塩液ソフトパック(大塚) 250ml 初回30mL/h、2回目180mL/h、3回目以降300mL/hで開始。インラインフィルターを用。	10mg /kg	1瓶 230ml	10:30						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ		1瓶	11:25						
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

3 / 4

レジメンNo. 17-IG0153

休薬期間 6日

最大回数 1回

レジメン名称 ★ELd療法(2サイクル)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(15)	day(16)	day(17)	day(18)	day(19)	day(20)	day(21)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL(フソー) 100ml ルートキープ	100ml	1瓶	09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/15分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カ'ト'ロン] ガスター注射液「20mg-2mL」 生理食塩液PL(フソー) 50ml		1瓶 1A 1瓶	09:30						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 133ml/h/45分かけて 生理食塩液PL(フソー) 100ml		1瓶	09:45						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 投与速度の詳細は、レシ'の参照情報を参照。 エムプリシティ点滴静注用「400mg」 300mgは13mL、400mgは17mLの注射用水で溶解。 注射用水 100ml 生理食塩液ソフトバック(大塚) 250ml 初回30mL/h、2回目180mL/h、3回目以降300mL/hで開始。インラインフィルターを用。		10mg /kg 1瓶 230ml	10:30						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ		1瓶	11:25						
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 血液腫瘍内科		分類 MM		4 / 4							
レジメンNo. 17-IG0153		休薬期間 6日		最大回数 1回							
レジメン名称 ★ELd療法(2サイクル)											
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(22)	day(23)	day(24)	day(25)	day(26)	day(27)	day(28)	
01	持続末梢静脈維持ルートから 生理食塩液PL(フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		09:00							
02	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/15分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カ'ト'ロン] ガスター注射液「20mg-2mL」 生理食塩液PL(フソー) 50ml	1瓶 1A 1瓶		09:30							
03	末梢静脈側管 点滴静注で 133ml/h/45分かけて 生理食塩液PL(フソー) 100ml	1瓶		09:45							
04	末梢静脈側管 点滴静注で 投与速度の詳細は、レ'ジ'メ'ン参照情報を参照。 エムプリシティ点滴静注用「400mg」 300mgは13mL、400mgは17mLの注射用水で溶解。 注射用水 100ml 生理食塩液ソ'ル'バ'ック(大塚) 250ml 初回30mL/h、2回目180mL/h、3回目以降300mL/hで開始。インラインフィルターを用。	10mg/kg 1瓶 230mL		10:30							
05	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		11:25							
―― 終了 ――											
レジメンNo.	17-IG0153										
レジメン名称	★ELd療法(2サイクル)										
レジメン参照情報											
【併用薬】 【前投薬】 ・デキサメタゾン錠:28mg day1 8.15.22 (Elotuzumab投与 3~24時間前) ・アセトアミノフェン錠:600mg day1 8.15.22 (Elotuzumab投与30~90分前) ・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩:2mg day1 8.15.22 (Elotuzumab投与30~90分前) 【治療薬】 ・レナリドミド:25mg/day day1-21											
レジメンコメント(医師専用)											

診療科血液腫瘍内科

分類MM

1 / 1

レジメンNo.17-IG0162

休薬期間13日

最大回数99回

レジメン名称★ELd療法(3サイクル～)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	持続末梢静脈維持ルートから 生理食塩液PL(フソー) 100ml ルートキープ	100ml	1瓶	09:00						
02	末梢静脈側管点滴静注で 200ml/h/15分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カ'ト'ン] ガスター注射液「20mg-2mL」 生理食塩液PL(フソー) 50ml		1瓶 1A 1瓶	09:30						
03	末梢静脈側管点滴静注で 133ml/h/45分かけて 生理食塩液PL(フソー) 100ml	100ml	1瓶	09:45						
04	末梢静脈側管点滴静注で 投与速度の詳細は、レ'ジ'メン参照情報を参照。 エムプリシティ点滴静注用「400mg」 300mgは13mL、400mgは17mLの注射用水で溶解。 注射用水 100ml 生理食塩液ソ'フト'バ'グ' (大塚) 250ml 初回30mL/h、2回目180mL/h、3回目以降300mL/hで開始。インラインフィルターを用。	10mg 230ml	/kg 1瓶	10:30						
05	末梢静脈側管点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ	50ml	1瓶	11:25						
終了										
レジメンNo.	17-IG0162									
レジメン名称	★ELd療法(3サイクル～)									
レジメン参照情報										
【併用薬】 【前投薬】 ・デキサメタゾン錠:28mg/day day1.15 (Elotuzumab投与3～24時間前) ・アセトアミノフェン錠:600mg day1.15 (Elotuzumab投与30～90分前) ・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩:2mg day1.15 (Elotuzumab投与30～90分前) 【治療薬】 ・レナリドミド:25mg/day day1-21										
レジメンコメント(医師専用)										