

診療科 血液腫瘍内科		分類 MM		1 / 4						
レジメンNo. 19-IG050		休薬期間 6日		最大回数 2回						
レジメン名称		★EPd療法(1サイクル)								
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL(フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/15分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カ'ート] ガスター注射液「20mg-2mL」 生理食塩液PL(フソー) 50ml	1瓶 1A 1瓶		09:30						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 133ml/h/45分かけて 生理食塩液PL(フソー) 100ml	1瓶		09:45						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 投与速度の詳細は、レ'ポ'ル参照情報を参照。 エムプリシディ点滴静注用「400mg」 300mgは13mL、400mgは17mLの注射用水で溶解。 注射用水 100ml 生理食塩液ソ'ト'ハ'ック(大塚) 250ml 初回30mL/h、2回目180mL/h、3回目以降300mL/hで開始。インラインフィルターを用。	10mg /kg 1瓶 230mL		10:30						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		13:15						
続きあり										
レジメンコメント(医師専用)										

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

2 / 4

レジメンNo. 19-IG050

休薬期間 6日

最大回数 2回

レジメン名称 ★EPd療法(1サイクル)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL (フソー) 100ml ルートキープ		1瓶	09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/15 分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カ'トン] ガスター注射液「20mg-2mL」 生理食塩液PL (フソー) 50ml		1瓶 1A 1瓶	09:30						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 133ml/h/45 分かけて 生理食塩液PL (フソー) 100ml		1瓶	09:45						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 投与速度の詳細は、レジメン参照情報を参照。 エムブリシテリ点静注用「400mg」 300mgは13mL、400mgは17mLの注射用水で溶解。 注射用水 100ml 生理食塩液ソフトバック(大塚) 250ml 初回30mL/h、2回目180mL/h、3回目以降300mL/hで開始。インラインフィルターを用。		10mg /kg 1瓶 230mL	10:30						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) 50ml フラッシュ		1瓶	11:45						
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 血液腫瘍内科		分類 MM		3 / 4						
レジメンNo. 19-IG050		休薬期間 6日		最大回数 2回						
レジメン名称 ★EPd療法(1サイクル)										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(15)	day(16)	day(17)	day(18)	day(19)	day(20)	day(21)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL(フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/15分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デカドロン] 1瓶 ガスター注射液「20mg-2mL」 1A 生理食塩液PL(フソー) 50ml 1瓶			09:30						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 133ml/h/45分かけて 生理食塩液PL(フソー) 100ml	1瓶		09:45						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 投与速度の詳細は、レジメン参照情報を参照。 エムプリシディ点滴静注用「400mg」 10mg /kg 300mgは13mL、400mgは17mLの注射用水で溶解。 注射用水 100ml 1瓶 生理食塩液ソフトバック(大塚) 250ml 230ml 初回30mL/h、2回目180mL/h、3回目以降300mL/hで開始。インラインフィルターを用。			10:30						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		11:25						
続きあり										
レジメンコメント(医師専用)										

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

4 / 4

レジメンNo. 19-IG050

休薬期間 6日

最大回数 2回

レジメン名称 ★EPd療法(1サイクル)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(22)	day(23)	day(24)	day(25)	day(26)	day(27)	day(28)
01	持続末梢静脈維持ルートから 生理食塩液PL(フソー) 100mL ルートキープ	100mL	1瓶	09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 200mL/h/15分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デカトロン] ガスター注射液「20mg-2mL」 生理食塩液PL(フソー) 50mL		1瓶 1A 1瓶	09:30						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 133mL/h/45分かけて 生理食塩液PL(フソー) 100mL		1瓶	09:45						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 投与速度の詳細は、レジメン参照情報を参照。 エムプリシティ点滴静注用「400mg」 300mgは13mL、400mgは17mLの注射用水で溶解。 注射用水 100mL 生理食塩液ワットバグ(大塚) 250mL 初回30mL/h、2回目180mL/h、3回目以降300mL/hで開始。インラインフィルターを用。	10mg 230mL	/kg 1瓶	10:30						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50mL フラッシュ		1瓶	11:25						

終了

レジメンNo. 19-IG050

レジメン名称 ★EPd療法(1サイクル)

レジメン参照情報

【併用薬】

(前投薬)

- ・デキサメタゾン錠:28mg/day day1 8.15.22 (Elotuzumab投与 3〜24時間前)
- ・アセトアミノフェン錠:600mg day1.8.15.22 (Elotuzumab投与45〜90分前)
- ・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩:2mg day1.8.15.22 (Elotuzumab投与45〜90分前)

【治療薬】

- ・ボマリトミド:4mg/day day1-21

レジメンコメント(医師専用)

診療科 血液腫瘍内科		分類 MM		1 / 4						
レジメンNo. 19-IG051		休薬期間 6日		最大回数 1回						
レジメン名称		★EPd療法 (2サイクル)								
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL (フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/15分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」 [デ*カ*ロン] ガスター注射液「20mg-2mL」 生理食塩液PL (フソー) 50ml	1瓶 1A 1瓶		09:30						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 133ml/h/45分かけて 生理食塩液PL (フソー) 100ml	1瓶		09:45						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 投与速度の詳細は、レジメン参照情報を参照。 エムプリシティ点滴静注用「400mg」 300mgは13mL、400mgは17mLの注射用水で溶解。 注射用水 100ml 生理食塩液ソフトパ*ック (大塚) 250ml 初回30mL/h、2回目180mL/h、3回目以降300mL/hで開始。インラインフィルターを用。	10mg /kg 1瓶 230ml		10:30						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		11:25						
続きあり										
レジメンコメント (医師専用)										

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

2 / 4

レジメンNo. 19-IG051

休薬期間 6日

最大回数 1回

レジメン名称 ★EPd療法(2サイクル)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL(フソー) 100ml ルートキープ	100ml	1瓶	09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/15分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カ'ロン] ガスター注射液「20mg-2mL」 生理食塩液PL(フソー) 50ml		1瓶 1A 1瓶	09:30						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 133ml/h/45分かけて 生理食塩液PL(フソー) 100ml		1瓶	09:45						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 投与速度の詳細は、レ'ポ'の参照情報を参照。 エムブリシテ'i点滴静注用「400mg」 300mgは13mL、400mgは17mLの注射用水で溶解。 注射用水 100ml 生理食塩液ソフトバ'ッグ(大塚) 250ml 初回30mL/h、2回目180mL/h、3回目以降300mL/hで開始。インラインフィルターを 用。		10mg /kg 1瓶 230mL	10:30						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ		1瓶	11:25						
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

3 / 4

レジメンNo. 19-IG051

休薬期間 6日

最大回数 1回

レジメン名称 ★EPd療法(2サイクル)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(15)	day(16)	day(17)	day(18)	day(19)	day(20)	day(21)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL(フソー) 100ml ルートキープ	100ml	1瓶	09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/15分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カ'ロン] ガスター注射液「20mg-2mL」 生理食塩液PL(フソー) 50ml		1瓶 1A 1瓶	09:30						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 133ml/h/45分かけて 生理食塩液PL(フソー) 100ml	100ml	1瓶	09:45						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 投与速度の詳細は、レジメン参照情報を参照。 エムブリシテ点静注用「400mg」 300mgは13mL、400mgは17mLの注射用水で溶解。 注射用水 100ml 生理食塩液ソフトバッグ(大塚) 250ml 初回30mL/h、2回目180mL/h、3回目以降300mL/hで開始。インラインフィルターを用。	10mg 230mL	/kg 1瓶	10:30						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ	50ml	1瓶	11:25						
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 血液腫瘍内科		分類 MM		4 / 4						
レジメンNo. 19-IG051		休薬期間 6日		最大回数 1回						
レジメン名称		★EPd療法(2サイクル)								
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(22)	day(23)	day(24)	day(25)	day(26)	day(27)	day(28)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL(フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/15分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デカドロン] 1瓶 ガスター注射液「20mg-2mL」 1A 生理食塩液PL(フソー) 50ml 1瓶			09:30						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 133ml/h/45分かけて 生理食塩液PL(フソー) 100ml	1瓶		09:45						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 投与速度の詳細は、レジメン参照情報を参照。 エムプリシティ点滴静注用「400mg」 10mg/kg 300mgは13mL、400mgは17mLの注射用水で溶解。 注射用水 100ml 1瓶 生理食塩液ソトバグ(大塚) 250ml 230mL 初回30mL/h、2回目180mL/h、3回目以降300mL/hで開始。インラインフィルターを用。			10:30						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		11:25						
終了										
レジメンNo.	19-IG051									
レジメン名称	★EPd療法(2サイクル)									
レジメン参照情報										
【併用薬】 【前投薬】 ・デキサメタゾン錠:28mg/day day1.8.15.22 (Elotuzumab投与 3〜24時間前) ・アセトアミノフェン錠:600mg day1.8.15.22 (Elotuzumab投与45〜90分前) ・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩:2mg day1.8.15.22 (Elotuzumab投与45〜90分前) 【治療薬】 ・ボマリトミド:4mg/day day1-21										
レジメンコメント(医師専用)										

診療科 血液腫瘍内科		分類 MM		1 / 1						
レジメンNo. 19-IG052		休薬期間 27日		最大回数 999回						
レジメン名称		★EPd療法(3サイクル以降)								
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	持続末梢静脈維持ルートから 生理食塩液PL(フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/15分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カド'ロン] ガスター注射液「20mg-2mL」 生理食塩液PL(フソー) 50ml	1瓶 1A 1瓶		09:30						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 133ml/h/45分かけて 生理食塩液PL(フソー) 100ml	1瓶		09:45						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 投与速度の詳細は、レ'ジ'メン参照情報を参照。 エムプリシティ点滴静注用「400mg」 300mgは13mL、400mgは17mLの注射用水で溶解。 注射用水 100ml 生理食塩液ワトハ'ック(大塚) 250ml 20mg/kg投与時: 初回180mL/h、2回目以降300mL/hで開始。インラインフィルターを使用。	20mg /kg 1瓶 230mL		10:30						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		11:45						
―― 終了 ――										
レジメンNo.	19-IG052									
レジメン名称	★EPd療法(3サイクル以降)									
レジメン参照情報										
(併用薬) (前投薬) ・デキサメタゾン錠:28mg/day day1 (Elotuzumab投与 3〜24時間前) ・アセトアミノフェン錠:600mg day1 (Elotuzumab投与45〜90分前) ・ド-クロルフェニラミンマレイン酸塩:2mg day1 (Elotuzumab投与45〜90分前) (治療薬) ・ボマリドミド:4mg/day day1-21										
レジメンコメント(医師専用)										