

診療科 血液腫瘍内科		分類 外来用		1 / 3						
レジメンNo. 18-IG025		休薬期間 12日		最大回数 1回						
レジメン名称		★Kd療法第1サイクル								
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	点滴静注 抜き刺しで 全開で 生理食塩液ソフトパック(大塚) 250ml ルトキープ	1袋		10:20	10:20					
02	点滴静注 抜き刺しで 全開で デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デカトロン] デキサート注射液(1.65mg-0.5mL)[デカトロン] 5%ブドウ糖液 50ml	2% 2A 1瓶		10:50	10:50					
03	点滴静注 抜き刺しで 30分かけて カイプロリス点滴静注用「40mg」 10mg1ﾊﾞｲﾙあたり注射用水5ml、40mg1ﾊﾞｲﾙあたり20mlで溶解 注射用水 20ml 5%ブドウ糖液 100ml 薬剤注入量分5%Glu廃棄。	20mg /m ² 1A 1瓶		11:00	11:00					
04	点滴静注 抜き刺しで 全開で 5%ブドウ糖液 50ml フラッシュ	1瓶		11:30	11:30					
続きあり										
レジメンコメント(医師専用)										

診療科 血液腫瘍内科

分類 外来用

2 / 3

レジメンNo. 18-IG025

休薬期間 12日

最大回数 1回

レジメン名称 ★Kd療法第1サイクル

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
05	点滴静注 抜き刺しで 全開で 生理食塩液77ℓハッグ(大塚) 250ml ルトキフ	1袋		10:20	10:20					
06	点滴静注 抜き刺しで 全開で デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デカトロン] デキサート注射液(1.65mg-0.5mL)[デカトロン] 5%ブドウ糖液 50ml	2瓶 2A 1瓶		10:50	10:50					
07	点滴静注 抜き刺しで 30分かけて カイプロリス点滴静注用「40mg」 10mg1ℓあたり注射用水5ml、40mg1ℓあたり20mlで溶解 注射用水 100ml 5%ブドウ糖液 100ml 薬剤注入量分5%Glu廃棄。	56mg /m ² 1瓶 1瓶		11:00	11:00					
08	点滴静注 抜き刺しで 全開で 5%ブドウ糖液 50ml フラッシュ	1瓶		11:30	11:30					
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 血液腫瘍内科		分類 外来用		3 / 3						
レジメンNo. 18-IG025		休薬期間 12日		最大回数 1回						
レジメン名称 ★Kd療法第1サイクル										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(15)	day(16)	day(17)	day(18)	day(19)	day(20)	day(21)
09	点滴静注 抜き刺しで 全開で 生理食塩液770mlバッグ(大塚) 250ml ルトキープ	1袋		10:20	10:20					
10	点滴静注 抜き刺しで 全開で デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カト'ロン] デキサート注射液(1.65mg-0.5mL)[デ'カト'ロン] 5%ブドウ糖液 50ml	2% 2A 1瓶		10:50	10:50					
11	点滴静注 抜き刺しで 30分かけて カイプロリス点滴静注用「40mg」 10mg1mlあたり注射用水5ml、40mg1mlあたり20mlで溶解 注射用水 100ml 5%ブドウ糖液 100ml 薬剤注入量分5%Glu廃棄。	56mg /m ² 1瓶 1瓶		11:00	11:00					
12	点滴静注 抜き刺しで 全開で 5%ブドウ糖液 50ml フラッシュ	1瓶		11:30	11:30					
終了										
レジメンNo.	18-IG025									
レジメン名称	★Kd療法第1サイクル									
レジメン参照情報										
【併用薬】 *day22,23に デキサメタゾン注「6.6mg」2mlバイアル デキサメタゾン注(1.65mg)2アンブル 5%ブドウ糖液50ml を点滴投与。 または、 デキサメタゾン錠「4mg」5錠 分1 を経口投与。										
レジメンコメント(医師専用)										

診療科 血液腫瘍内科

分類 外来用

1 / 3

レジメンNo. 18-IG026

休薬期間 12日

最大回数 99回

レジメン名称 ★Kd療法第2サイクル以降

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	点滴静注 抜き刺しで 全開で 生理食塩液ワトパック(大塚) 250ml ルトキープ		1袋	10:20	10:20					
02	点滴静注 抜き刺しで 全開で デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デカトロン] デキサート注射液(1.65mg-0.5mL)[デカトロン] 5%ブドウ糖液 50ml		2% 2A 1瓶	10:50	10:50					
03	点滴静注 抜き刺しで 30分かけて カイプロリス点滴静注用「40mg」 10mg1ℓあたり注射用水5ml、40mg1ℓあたり20mlで溶解 注射用水 100ml 5%ブドウ糖液 100ml 薬剤注入量分5%Glu廃棄。		56mg /m ² 1瓶 1瓶	11:00	11:00					
04	点滴静注 抜き刺しで 全開で 5%ブドウ糖液 50ml フラッシュ		1瓶	11:30	11:30					
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 血液腫瘍内科

分類 外来用

2 / 3

レジメンNo. 18-IG026

休薬期間 12日

最大回数 99回

レジメン名称 ★Kd療法第2サイクル以降

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
05	点滴静注 抜き刺しで 全開で 生理食塩液770mlバッグ(大塚) 250ml ルトキーフ		1袋	10:20	10:20					
06	点滴静注 抜き刺しで 全開で デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カト'ロン] デキサート注射液(1.65mg-0.5mL)[デ'カト'ロン] 5% ブドウ糖液 50ml		2瓶 2A 1瓶	10:50	10:50					
07	点滴静注 抜き刺しで 30分かけて カイプロリス点滴静注用「40mg」 10mg1mlあたり注射用水5ml、40mg1mlあたり20mlで溶解 注射用水 100ml 5% ブドウ糖液 100ml 薬剤注入量分5%Glu廃棄。		56mg /m ² 1瓶 1瓶	11:00	11:00					
08	点滴静注 抜き刺しで 全開で 5% ブドウ糖液 50ml フラッシュ		1瓶	11:30	11:30					
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 血液腫瘍内科

分類 外来用

3 / 3

レジメンNo. 18-IG026

休薬期間 12日

最大回数 99回

レジメン名称 ★Kd療法第2サイクル以降

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(15)	day(16)	day(17)	day(18)	day(19)	day(20)	day(21)
09	点滴静注 抜き刺しで 全開で 生理食塩液ワトバ [®] ッグ [®] (大塚) 250ml ルトキープ [®]	1袋		10:50	10:50					
10	点滴静注 抜き刺しで 全開で デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ [®] カト [®] ロン] デキサート注射液(1.65mg-0.5mL)[デ [®] カト [®] ロン] 5% ブドウ糖液 50ml	2% 2A 1瓶		10:50	10:50					
11	点滴静注 抜き刺しで 30分かけて カイプロリス点滴静注用「40mg」 10mg1バイアルあたり注射用水5ml、40mg1バイアルあたり20mlで溶解 注射用水 100ml 5% ブドウ糖液 100ml 薬剤注入量分5%Glu廃棄。	56mg /ml 1瓶 1瓶		11:00	11:00					
12	点滴静注 抜き刺しで 全開で 5% ブドウ糖液 50ml フラッシュ	1瓶		11:30	11:30					

終了

レジメンNo. 18-IG026

レジメン名称 ★Kd療法第2サイクル以降

レジメン参照情報

【併用薬】

・day22,23に
デキサメタゾン注「6.6mg」2バイアル
デキサメタゾン注(1.65mg)2アンプル
5%ブドウ糖液50ml
を点滴投与。

または、
デキサメタゾン錠「4mg」5錠 分1
を経口投与。

レジメンコメント(医師専用)