

診療科 血液腫瘍内科		分類 リンパ腫		1 / 2						
レジメンNo. 19-IG004		休薬期間 6日		最大回数 1回						
レジメン名称		★Obinutuzumab+CHOP療法(1サイクル day1, 2)								
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL(フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		08:45	10:00					
02	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/15分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カ'ロン] 生理食塩液PL(フソー) 50ml	3瓶 1瓶		09:15						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/15分かけて ポラミン(5mg) 生理食塩液PL(フソー) 50ml	1A 1瓶		09:30						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 400ml/h/15分かけて アセリオ静注液バッグ(1000mg-100mL)	1袋		09:45						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 30分かけて 生理食塩液PL(フソー) 50ml	1瓶		10:00						
06	末梢静脈側管 点滴静注で ガザイバ点滴静注(1000mg-40mL) 生理食塩液ワトバッグ(大塚) 250ml 投与速度はレジメン参照情報に記載。インラインフィルター使用。	1000mg 210ml	/Body	10:30						
07	末梢静脈側管 点滴静注で 30分かけて グラニセトロン静注液(3mg-3mL)[カイトリル] 生理食塩液PL(フソー) 50ml	1A 1瓶			10:30					
08	末梢静脈側管 点滴静注で 全開で オンコビン(1mg) 生理食塩液PL(フソー) 50ml	1.4mg 1瓶	/m ²		11:00					
09	末梢静脈側管 点滴静注で 30分かけて アドリアシン注用「50mg」 5%ブドウ糖液 50ml	50mg 1瓶	/m ²		11:10					
10	末梢静脈側管 点滴静注で 180分かけて 注射用エンドキサン「500mg」 生理食塩液PL(フソー) 500ml	750mg 1瓶	/m ²		11:40					
..... 続きあり										
レジメンコメント(医師専用)										

診療科 血液腫瘍内科		分類 リンパ腫		2 / 2						
レジメンNo. 19-IG004		休薬期間 6日		最大回数 1回						
レジメン名称		★Obinutuzumab+CHOP療法(1サイクル day1,2)								
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
11	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		14:45	14:40					
終了										
レジメンNo. 19-IG004 レジメン名称 ★Obinutuzumab+CHOP療法(1サイクル day1,2) レジメン参照情報 【併用薬】 ・アトニゾロン錠:100mg day2-6 【併用薬(推奨)】 ・アブヒタントカプセル:125mg day2 ・アブヒタントカプセル:80mg day3-4										
レジメンコメント(医師専用)										

診療科 血液腫瘍内科

分類 リンパ腫

1 / 1

レジメンNo. 19-IG005

休薬期間 6日

最大回数 2回

レジメン名称 Obinutuzumab+CHOP療法(1サイクル day8, 15)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	持続末梢静脈維持ルートから 生理食塩液PL(フソー) 100ml ルートキープ	100ml	1瓶	09:45						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 400ml/h/15分かけて アセリオ静注液バッグ(1000mg-100ml)	1000mg	1袋	10:15						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 30分かけて 生理食塩液PL(フソー) 50ml	50ml	1瓶	10:30						
04	末梢静脈側管 点滴静注で ガザイバ点滴静注(1000mg-40ml) 生理食塩液ワットバッグ(大塚) 250ml 投与速度はレジメン参照情報に記載。インラインフィルター使用。	1000mg 210ml	/Body	11:00						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ	50ml	1瓶	14:15						
終了										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 血液腫瘍内科		分類 リンパ腫		1 / 1						
レジメンNo. 19-IG006		休薬期間 19日		最大回数 7回						
レジメン名称		★Obinutuzumab+CHOP療法(2-8サイクル)								
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	持続末梢静脈維持ルートから 生理食塩液PL(フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		09:45	10:00					
02	末梢静脈側管 点滴静注で 400ml/h/15分かけて アセリオ静注液バッグ(1000mg-100mL)	1袋		10:15						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 30分かけて 生理食塩液PL(フソー) 50ml	1瓶		10:30						
04	末梢静脈側管 点滴静注で ガザイバ点滴静注(1000mg-40mL) 生理食塩液リトバック(大塚) 250ml 投与速度はレジメン参照情報に記載。インラインフィルター使用。	1000mg 210ml	/Body	11:00						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 30分かけて グラニセトロン静注液(3mg-3mL)[カイトル] 生理食塩液PL(フソー) 50ml	1A 1瓶			10:30					
06	末梢静脈側管 点滴静注で 全開で オンコビン(1mg) 生理食塩液PL(フソー) 50ml	1.4mg 1瓶	/m ²		11:00					
07	末梢静脈側管 点滴静注で 30分かけて アドリアシン注用「50mg」 5%ブドウ糖液 50ml	50mg 1瓶	/m ²		11:10					
08	末梢静脈側管 点滴静注で 180分かけて 注射用エンドキサン「500mg」 生理食塩液PL(フソー) 500ml	750mg 1瓶	/m ²		11:40					
09	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		14:15	14:40					
―― 終了 ――										
レジメンNo.	19-IG006									
レジメン名称	★Obinutuzumab+CHOP療法(2-8サイクル)									
レジメン参照情報										
【併用薬】 ・PSL:100mg day2-6										
【併用薬(推奨)】 ・アブレヒタントカプセル:125mg day2 ・アブレヒタントカプセル:80mg day3-4										
レジメンコメント(医師専用)										