

診療科 血液腫瘍内科		分類 リンパ腫		1 / 1						
レジメンNo. 09-IG051		休薬期間 15日		最大回数 8回						
レジメン名称 R-CHOP療法										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 100ml ルトキフ	100ml	1瓶	10:30						
02	末梢静脈側管 点滴静注で リツキシマブBS点滴静注「500mg-50mL」 生理食塩液PL(フソー) 500ml 初回50ml/h開始,以降100ml/h開始可.30分毎速め最速400ml/h	375mg	/m ² 1瓶	11:00						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ	50ml	1瓶	14:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で グラニセトロン静注液(3mg-3mL)[カイトル] 生理食塩液PL(フソー) 50ml 全開で	1A	1瓶		10:00					
05	末梢静脈側管 点滴静注で オンコピン(1mg) 生理食塩液PL(フソー) 50ml 全開で	1.4mg	/m ² 1瓶		11:00					
06	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/30分かけて アドリアシン注用(10mg) 5%ブドウ糖液 50ml	50mg	/m ² 1瓶		11:10					
07	末梢静脈側管 点滴静注で 166ml/h/180分かけて 注射用エンドキサン「500mg」 生理食塩液PL(フソー) 500ml	750mg	/m ² 1瓶		11:40					
08	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ	50ml	1瓶		14:40					
01	ブルフェン錠(100mg) 内) d-クロルフェニラミン酸塩錠(2mg) 分1:朝食後 リツキサン投与30分~1時間前に	2 1	T T	●						
01	プレドニン錠[プレドニゾール](5mg) 食後:朝8時~夕6時	20	T		●	→	→	→	→	
―― 終了 ――										
レジメンコメント(医師専用) レジメンNo. 09-IG051 レジメン名称 R-CHOP療法 レジメン参照情報 【併用薬】 ・PSL:100mg/day day2-6 ・イブプロフェン:200mg day1 ・d-クロルフェニラミン:2mg day1										