

診療科 血液腫瘍内科		分類 リンパ 腫		1 / 1						
レジメンNo. 09-IG052		休薬期間 15日		最大回数 8回						
レジメン名称 R-COP療法										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 100ml ルトキ-フ	1瓶		10:30						
02	末梢静脈側管 点滴静注で リツキシマBS点滴静注「500mg-50mL」 生理食塩液PL(フソー) 500ml 初回50ml/h開始,以降100ml/h開始可,30分毎速め最速400ml/h	375mg 1瓶	/m ²	11:00						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		14:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で グラニセトロン静注液(3mg-3mL)[カイトル] 生理食塩液PL(フソー) 50ml	1A 1瓶		10:30						
05	末梢静脈側管 点滴静注で オンコビン(1mg) 生理食塩液PL(フソー) 50ml	1.4mg 1瓶	/m ²	11:00						
06	末梢静脈側管 点滴静注で 250ml/h/120分かけて 注射用エンドキサン「500mg」 生理食塩液PL(フソー) 500ml	750mg 1瓶	/m ²	11:10						
07	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		13:10						
01	ブルフェン錠(100mg) 内) d-クロルフェニラミン酸塩錠(2mg) 分1:朝食後 リツキサン投与30分~1時間前に	2 1	T T 1日分	●						
01	プレドニン錠[プレドニゾン](5mg) 食後:朝8昼6夕6	20	T 5日分		●	→	→	→	→	
—— 終了 ——										
レジメンNo. 09-IG052 レジメン名称 R-COP療法 レジメン参照情報 【併用薬】 ・PSL:100mg/day day2-6 ・イブプロフェン:200mg day1 ・d-クロルフェニラミン:2mg day1										
レジメンコメント(医師専用)										