

診療科 血液腫瘍内科		分類 外来用		1 / 1						
レジメンNo. 10-IG006		休薬期間 16日		最大回数 8回						
レジメン名称 ★THP-COP療法										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL(フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		10:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 全開で グラニセトロン静注液(3mg-3mL)[カイトリル] 生理食塩液PL(フソー) 50ml	1A 1瓶		10:30						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 全開で オンコビン(1mg) 生理食塩液PL(フソー) 50ml	1.4mg 1瓶	/m ²	11:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/30分かけて テラルピシン注射用(20mg) 5%ブドウ糖液 50ml	50mg 1瓶	/m ²	11:10						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 167ml/h/180分かけて 注射用エンドキサン「500mg」 生理食塩液PL(フソー) 500ml	750mg 1瓶	/m ²	11:40						
06	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		14:40						
01	プレドニン錠[プレドニゾール](5mg) 食後:朝8時6時6	20	T 5日分	●	→	→	→	→		
終了										
レジメンNo.	10-IG006									
レジメン名称	★THP-COP療法									
レジメン参照情報										
【併用薬】 *PSL:100mg/day day1-5										
レジメンコメント(医師専用)										