

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

2021/11/26 09:05

1 / 3

レジメンNo. 18-IG0261

休薬期間 13日

最大回数 1回

レジメン名称 ★Weekly Kd療法(1サイクル)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 5% ブドウ糖液 100ml ルートキープ	1瓶		10:20						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 全開で デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カ'ロン] 5% ブドウ糖液 50ml	5% 1瓶		10:50						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 30分かけて カイプロリス点滴静注用「40mg」 10mg1ﾊﾞｲｱﾙあたり注射用水5ml、40mg1ﾊﾞｲｱﾙあたり20mlで溶解 注射用水 20ml 5% ブドウ糖液 100ml 薬剤注入量分5%Glu廃棄。	20mg 1A 1瓶	/m ²	11:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 5% ブドウ糖液 50ml フラッシュ	1瓶		11:30						
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

2021/11/26 09:05

2 / 3

レジメンNo. 18-IG0261

休薬期間 13日

最大回数 1回

レジメン名称 ★Weekly Kd療法(1サイクル)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
05	持続末梢静脈 維持ルートから 5% ブドウ糖液 100ml ルートへ	1瓶		10:20						
06	末梢静脈側管 点滴静注で 全開で デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デカトロン] 5% ブドウ糖液 50ml	5% 1瓶		10:50						
07	末梢静脈側管 点滴静注で 30分かけて カイプロリス点滴静注用「40mg」 10mg1mlあたり注射用水5ml、40mg1mlあたり20mlで溶解 注射用水 100ml 5% ブドウ糖液 100ml 薬剤注入量分5%Glu廃棄。	70mg 1瓶 1瓶	/m ²	11:00						
08	末梢静脈側管 点滴静注で 5% ブドウ糖液 50ml フラッシュ	1瓶		11:30						
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

2021/11/26 09:05

3 / 3

レジメンNo. 18-IG0261

休薬期間 13日

最大回数 1回

レジメン名称 ★Weekly Kd療法(1サイクル)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(15)	day(16)	day(17)	day(18)	day(19)	day(20)	day(21)
05	持続末梢静脈 維持ルートから 5% ブドウ糖液 100ml ルートキープ	1瓶		10:20						
06	末梢静脈側管 点滴静注で 全開で デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デカトロン] 5% ブドウ糖液 50ml	5瓶 1瓶		10:50						
07	末梢静脈側管 点滴静注で 30分かけて カイプロリス点滴静注用「40mg」 10mg1ﾊﾞｲﾙあたり注射用水5ml、40mg1ﾊﾞｲﾙあたり20mlで溶解 注射用水 100ml 5% ブドウ糖液 100ml 薬剤注入量分5%Glu廃棄。	70mg 1瓶	/mi	11:00						
08	末梢静脈側管 点滴静注で 5% ブドウ糖液 50ml フラッシュ	1瓶		11:30						

終了

レジメンコメント(医師専用)

レジメン参照情報

【併用薬】

・デキサメタゾン: 40mg day22

※注射・内服どちらも可

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

2021/11/26 09:05

1 / 3

レジメンNo. 18-IG0262

休薬期間 13日

最大回数 99回

レジメン名称 ★Weekly Kd療法 (2サイクル以降)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 5% ブドウ糖液 100ml ルート閉	1瓶		10:20						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 全開で デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デカトロン] 5% ブドウ糖液 50ml	5% 1瓶		10:50						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 30分かけて カイプロリス点滴静注用「40mg」 10mg1ℓあたり注射用水5ml、40mg1ℓあたり20mlで溶解 注射用水 100ml 5% ブドウ糖液 100ml 薬剤注入量分5%Glu廃棄。	70mg 1瓶 1瓶	/m ²	11:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 5% ブドウ糖液 50ml フラッシュ	1瓶		11:30						
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

2021/11/26 09:05

2 / 3

レジメンNo. 18-IG0262

休薬期間 13日

最大回数 99回

レジメン名称 ★Weekly Kd療法 (2サイクル以降)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 5% ブドウ糖液 100ml ルートキープ	1瓶		10:20						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 全開で デキサート注射液「6.6mg-2mL」 [デ'カ'ロン] 5% ブドウ糖液 50ml	5% 1瓶		10:50						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 30 分かけて カイプロリス点滴静注用「40mg」 10mg1ℓあたり注射用水5ml、40mg1ℓあたり20mlで溶解 注射用水 100ml 5% ブドウ糖液 100ml 薬剤注入量分5%Glu廃棄。	70mg 1瓶	/ml	11:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 5% ブドウ糖液 50ml フラッシュ	1瓶		11:30						
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

2021/11/26 09:05

3 / 3

レジメンNo. 18-IG0262

休薬期間 13日

最大回数 99回

レジメン名称 ★Weekly Kd療法 (2サイクル以降)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 5% ブドウ糖液 100ml ルートキープ	1瓶		10:20						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 全開で デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カ'ロン] 5% ブドウ糖液 50ml	5% 1瓶		10:50						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 30 分かけて カイプロリス点滴静注用「40mg」 10mg1ﾊﾞｲﾙあたり注射用水5ml、40mg1ﾊﾞｲﾙあたり20mlで溶解 注射用水 100ml 5% ブドウ糖液 100ml 薬剤注入量分5%Glu廃棄。	70mg 1瓶	/m ²	11:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 5% ブドウ糖液 50ml フラッシュ	1瓶		11:30						
終了										

レジメンコメント(医師専用)

レジメン参照情報

【併用薬】

・デキサメタゾン:40mg day22

※注射・内服どちらも可