

1 / 4

最大回数 2回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	皮下注 皮下注射 3 ～ 5 分かけて ダラキューロ配合皮下注(1800mg－ 1 5 m L)	1800mg	/Body	10:00						
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

2021/11/26 09:05

2 / 4

レジメンNo. 21-IG005

休薬期間 6日

最大回数 2回

レジメン名称 ★(s.c.)DLd療法(1-2サイクル)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
01	皮下注 皮下注射 3～5分かけて ダラキューロ配合皮下注(1800mg－1.5mL)	1800mg	/Body	10:00						
	続きあり									

レジメンコメント(医師専用)

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

2021/11/26 09:05

3 / 4

レジメンNo. 21-IG005

休薬期間 6日

最大回数 2回

レジメン名称 ★(s.c.)DLd療法(1-2サイクル)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(15)	day(16)	day(17)	day(18)	day(19)	day(20)	day(21)
01	皮下注 皮下注射 3～5分かけて ダラキューロ配合皮下注(1800mg－15mL)	1800mg	/Body	10:00						
	続きあり									

レジメンコメント(医師専用)

診療科 血液腫瘍内科		分類 MM	2021/11/26 09:05				4 / 4			
レジメンNo. 21-IG005		休薬期間 6日	最大回数 2回							
レジメン名称 ★(s.c.)DLd療法(1-2サイクル)										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(22)	day(23)	day(24)	day(25)	day(26)	day(27)	day(28)
01	皮下注 皮下注射 3～5分かけて ダラキューロ配合皮下注(1800mg－1.5mL)	1800mg	/Body	10:00						
―― 終了 ――										
レジメンコメント(医師専用)										

レジメン参照情報

【併用薬】

- ・レナリドミド: 25mg day1-21
- ・デキサメタゾン錠: 20mg day1、2、8、9、15、16、22、23
- ・アセトアミノフェン: 600-1000mg day1、8、15、22
- ・d-クロルフェニラミン: 2mg day1、8、15、22

【投与上の注意】

- ・ダラツムマブ皮下注: 臍から左又は右に約 7.5cm の腹部皮下に投与

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

2021/11/26 09:06

1 / 1

レジメンNo. 21-IG006

休薬期間 6日

最大回数 2回

レジメン名称 ★(s.c.)DLd療法(1サイクル day15、22)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	皮下注 皮下注射 3～5分かけて ダラキューロ配合皮下注(1800mg－15mL)	1800mg	/Body	10:00						
―― 終了 ――										

レジメンコメント(医師専用)

レジメン参照情報

【併用薬】

- ・レナリドミド: 25mg day1-21
- ・デキサメタゾン錠: 20mg day1、2、8、9、15、16、22、23
- ・アセトアミノフェン: 600-1000mg day1、8、15、22
- ・d-クロルフェニラミン: 2mg day1、8、15、22

【投与上の注意】

- ・ダラツムマブ皮下注: 臍から左又は右に約 7.5cm の腹部皮下に投与

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

2021/11/26 09:06

1 / 2

レジメンNo. 21-IG007

休薬期間 13日

最大回数 4回

レジメン名称 ★(s. c.)DLd療法(3-6サイクル)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	皮下注 皮下注射 3 ～ 5 分かけて ダラキューロ配合皮下注 (1800mg - 1.5 mL)	1800mg	/Body	10:00						
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

2 / 2

最大回数 4回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
01	皮下注 皮下注射 3～5分かけて ダラキューロ配合皮下注(1800mg－1.5mL)	1800mg	/Body	10:00						
終了										

レジメンコメント(医師専用)

レジメン参照情報

【併用薬】

- ・レナリトミド: 25mg day1-21
- ・デキサメタゾン錠: 20mg day1、2、8、9、15、16、22、23
- ・アセトアミノフェン: 600-1000mg day1、15
- ・d-クロルフェニラミン: 2mg day1、15

【投与上の注意】

- ・ダラツムマブ皮下注: 臍から左又は右に約 7.5cm の腹部皮下に投与

1 / 1

最大回数 999回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	皮下注 皮下注射 3 ～ 5 分かけて ダラキューロ配合皮下注 (1800mg－ 1 5 m L)	1800mg	/Body	10:00						
―― 終了 ――										

レジメンコメント(医師専用)

レジメン参照情報

【併用薬】

- ・レナリドミド: 25mg day1-21
- ・デキサメタゾン錠: 20mg day1、2、8、9、15、16、22、23
- ・アセトアミノフェン: 600-1000mg day1
- ・d-クロルフェニラミン: 2mg day1

【投与上の注意】

- ・ダラツムマブ皮下注: 臍から左又は右に約 7.5cm の腹部皮下に投与