

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

2021/11/26 09:06

1 / 3

レジメンNo. 21-IG009

休薬期間 6日

最大回数 3回

レジメン名称 ★(s.c.)DBd療法(1-3サイクル)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	皮下注 皮下注射 ベルケイド注射用(3mg) 生理食塩液PL(7%) 20ml ベルケイド1Vあたり、生食1.2mLで溶解。	1.3mg 1A	/m ²	10:00			10:00			
03	皮下注 皮下注射 3～5分かけて ダラキューロ配合皮下注(1800mg-15mL)	1800mg	/Body	10:00						
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

2021/11/26 09:06

2 / 3

レジメンNo. 21-IG009

休薬期間 6日

最大回数 3回

レジメン名称 ★(s.c.)DBd療法(1-3サイクル)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
02	皮下注 皮下注射 ベルケイド注射用(3mg) 生理食塩液PL(7%) 20ml ベリット1Vあたり、生食1.2mLで溶解。	1.3mg 1A	/m ²	10:00			10:00			
03	皮下注 皮下注射 3～5分かけて ダラキューロ配合皮下注(1800mg-15mL)	1800mg	/Body	10:00						
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

2021/11/26 09:06

3 / 3

レジメンNo. 21-IG009

休薬期間 6日

最大回数 3回

レジメン名称 ★(s.c.)DBd療法(1-3サイクル)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(15)	day(16)	day(17)	day(18)	day(19)	day(20)	day(21)
03	皮下注 皮下注射 3～5分かけて ダラキューロ配合皮下注(1800mg－1.5mL)	1800mg	/Body	10:00						
―― 終了 ――										

レジメンコメント(医師専用)

レジメン参照情報

【併用薬】

- ・デキサメタゾン錠: 20mg day1、2、4、5、8、9、11、12、15
- ・アセトアミノフェン: 600-1000mg day1、8、15
- ・d-クロルフェニラミン: 2mg day1、8、15

【投与上の注意】

- ・ダラツムマブ皮下注: 臍から左又は右に約 7.5cm の腹部皮下に投与

診療科 血液腫瘍内科		分類 MM	2021/11/26 09:06				1 / 1			
レジメンNo. 21-IG010		休薬期間 6日	最大回数 1回							
レジメン名称 ★(s.c.)DBd療法(1サイクル day15)										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	皮下注 皮下注射 3～5分かけて ダラキューロ配合皮下注(1800mg－1.5mL)	1800mg	/Body	10:00						
―― 終了 ――										
レジメンコメント(医師専用)										

レジメン参照情報

【併用薬】

- ・デキサメタゾン錠: 20mg day1、2、4、5、8、9、11、12、15
- ・アセトアミノフェン: 600-1000mg day1、8、15
- ・d-クロルフェニラミン: 2mg day1、8、15

【投与上の注意】

- ・ダラツムマブ皮下注: 臍から左又は右に約 7.5cm の腹部皮下に投与

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

2021/11/26 09:06

1 / 2

レジメンNo. 21-IG011

休薬期間 10日

最大回数 5回

レジメン名称 ★(s.c.)DBd療法(4-8サイクル)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	皮下注 皮下注射 ベルケイド注射用(3mg) 生理食塩液PL(7%-) 20ml ベルケイド1Vあたり、生食1.2mLで溶解。	1.3mg 1A	/m ²	10:00			10:00			
03	皮下注 皮下注射 3~5分かけて ダラキューロ配合皮下注(1800mg-15mL)	1800mg	/Body	10:00						
	続きあり									

レジメンコメント(医師専用)

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

2021/11/26 09:06

2 / 2

レジメンNo. 21-IG011

休薬期間 10日

最大回数 5回

レジメン名称 ★(s.c.)DBd療法(4-8サイクル)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
02	皮下注 皮下注射 ベルケイド注射用(3mg) 生理食塩液PL(7%-) 20ml ベルケイド1Vあたり、生食1.2mLで溶解。	1.3mg 1A	/m ²	10:00			10:00			
終了										

レジメンコメント(医師専用)

レジメン参照情報

【併用薬】

- ・デキサメタゾン錠: 20mg day1、2、4、5、8、9、11、12
- ・アセトアミノフェン: 600-1000mg day1
- ・d-クロルフェニラミン: 2mg day1

【投与上の注意】

- ・ダラツムマブ皮下注: 臍から左又は右に約 7.5cm の腹部皮下に投与

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

2021/11/26 09:06

1 / 1

レジメンNo. 21-IG012

休薬期間 27日

最大回数 999回

レジメン名称 ★(s.c.)DBd療法(9サイクル以降)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	皮下注 皮下注射 3～5分かけて ダラキューロ配合皮下注(1800mg－15mL)	1800mg	/Body	10:00						
―― 終了 ――										

レジメンコメント(医師専用)

レジメン参照情報

【併用薬】

- ・デキサメタゾン錠: 20mg day1
- ・アセトアミノフェン: 600-1000mg day1
- ・d-クロルフェニラミン: 2mg day1

【投与上の注意】

- ・ダラツムマブ皮下注: 臍から左又は右に約 7.5cm の腹部皮下に投与