

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

2021/11/26 09:06

1 / 4

レジメンNo. 21-IG017

休薬期間 6日

最大回数 1回

レジメン名称 ★(s.c.)DKd療法(1サイクル)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	皮下注 皮下注射 3～5分かけて ダラキューロ配合皮下注(1800mg-15mL)	1800mg	/Body	10:00						
02	持続末梢静脈 維持ルートから 5% ブドウ糖液 100mL ルートキープ	1瓶		10:15	10:15					
03	末梢静脈側管 点滴静注で 15分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カ'ロン] デキサート注射液(1.65mg-0.5mL)[デ'カ'ロン] 5% ブドウ糖液 50mL	2% 2A 1瓶		10:45	10:45					
04	末梢静脈側管 点滴静注で 30分かけて カイプロリス点滴静注用「40mg」 注射用水 20mL 5% ブドウ糖液 100mL 薬剤注入量分5%Glu廃棄。	20mg 1A 1瓶	/m ²	11:00	11:00					
05	末梢静脈側管 点滴静注で 5% ブドウ糖液 50mL フラッシュ	1瓶		11:30	11:30					
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

2021/11/26 09:06

2 / 4

レジメンNo. 21-IG017

休薬期間 6日

最大回数 1回

レジメン名称 ★(s.c.)DKd療法(1サイクル)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
01	皮下注 皮下注射 3～5分かけて ダラキューロ配合皮下注(1800mg-15mL)	1800mg	/Body	10:00						
06	持続末梢静脈 維持ルートから 5% ブドウ糖液 100mL ルートキープ	1瓶		10:15	10:15					
07	末梢静脈側管 点滴静注で 15分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カ'ロン] デキサート注射液(1.65mg-0.5mL)[デ'カ'ロン] 5% ブドウ糖液 50mL	29% 2A 1瓶		10:45	10:45					
08	末梢静脈側管 点滴静注で 30分かけて カイプロリス点滴静注用「40mg」 注射用水 100mL 5% ブドウ糖液 100mL 薬剤注入量分5%Glu廃棄。	56mg 1瓶 1瓶	/m ²	11:00	11:00					
09	末梢静脈側管 点滴静注で 5% ブドウ糖液 50mL フラッシュ	1瓶		11:30	11:30					
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

2021/11/26 09:06

3 / 4

レジメンNo. 21-IG017

休薬期間 6日

最大回数 1回

レジメン名称 ★(s.c.)DKd療法(1サイクル)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(15)	day(16)	day(17)	day(18)	day(19)	day(20)	day(21)
01	皮下注 皮下注射 3～5分かけて ダラキューロ配合皮下注(1800mg－15mL)	1800mg	/Body	10:00						
10	持続末梢静脈 維持ルートから 5% ブドウ糖液 100mL ルートキープ	1瓶		10:15	10:15					
11	末梢静脈側管 点滴静注で 15分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カ'ロン] デキサート注射液(1.65mg-0.5mL)[デ'カ'ロン] 5% ブドウ糖液 50mL	2% 2A 1瓶		10:45	10:45					
12	末梢静脈側管 点滴静注で 30分かけて カイプロリス点滴静注用「40mg」 注射用水 100mL 5% ブドウ糖液 100mL 薬剤注入量分5%Glu廃棄。	56mg 1瓶 1瓶	/m ²	11:00	11:00					
13	末梢静脈側管 点滴静注で 5% ブドウ糖液 50mL フラッシュ	1瓶		11:30	11:30					
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

2021/11/26 09:06

4 / 4

レジメンNo. 21-IG017

休薬期間 6日

最大回数 1回

レジメン名称 ★(s.c.)DKd療法(1サイクル)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
01	皮下注 皮下注射 3～5分かけて ダラキューロ配合皮下注(1800mg－1.5mL)	1800mg	/Body	10:00						
―― 終了 ――										

レジメンコメント(医師専用)

レジメン参照情報

【併用薬】

- ・デキサメタゾン錠:40mg day22
- ・アセトアミノフェン:600-1000mg day1、8、15、22
- ・d-クロルフェニラミン:2mg day1、8、15、22

【投与上の注意】

- ・ダラツムマブ皮下注:臍から左又は右に約 7.5cm の腹部皮下に投与

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

2021/11/26 09:06

1 / 2

レジメンNo. 21-IG018

休薬期間 6日

最大回数 1回

レジメン名称 ★(s.c.)DKd療法(1サイクル day15-28)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	皮下注 皮下注射 3～5分かけて ダラキューロ配合皮下注(1800mg-15mL)	1800mg	/Body	10:00						
02	持続末梢静脈 維持ルートから 5% ブドウ糖液 100mL ルートケア	1瓶		10:15	10:15					
03	末梢静脈側管 点滴静注で 15分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カ'ロン] デキサート注射液(1.65mg-0.5mL)[デ'カ'ロン] 5% ブドウ糖液 50mL	2瓶 2A 1瓶		10:45	10:45					
04	末梢静脈側管 点滴静注で 30分かけて カイプロリス点滴静注用「40mg」 注射用水 100mL 5% ブドウ糖液 100mL 薬剤注入量分5%Glu廃棄。	56mg 1瓶 1瓶	/m ²	11:00	11:00					
05	末梢静脈側管 点滴静注で 5% ブドウ糖液 50mL フラッシュ	1瓶		11:30	11:30					
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

2021/11/26 09:06

2 / 2

レジメンNo. 21-IG018

休薬期間 6日

最大回数 1回

レジメン名称 ★(s.c.)DKd療法(1サイクル day15-28)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
01	皮下注 皮下注射 3～5分かけて ダラキューロ配合皮下注(1800mg－1.5mL)	1800mg	/Body	10:00						
―― 終了 ――										

レジメンコメント(医師専用)

レジメン参照情報

【併用薬】

- ・デキサメタゾン錠:40mg day8(通算 day22)
- ・アセトアミノフェン:600-1000mg day1、8(通算 day15、22)
- ・ドクロルフェニラミン:2mg day1、8(通算 day15、22)

【投与上の注意】

- ・ダラツムマブ皮下注:臍から左又は右に約 7.5cm の腹部皮下に投与

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

2021/11/26 09:06

1 / 4

レジメンNo. 21-IG019

休薬期間 6日

最大回数 1回

レジメン名称 ★(s.c.)DKd療法(2サイクル)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	皮下注 皮下注射 3～5分かけて ダラキューロ配合皮下注(1800mg－15mL)	1800mg	/Body	10:00						
02	持続末梢静脈 維持ルートから 5%ブドウ糖液 100mL ルートキープ	1瓶		10:15	10:15					
03	末梢静脈側管 点滴静注で 15分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カ'ロン] デキサート注射液(1.65mg-0.5mL)[デ'カ'ロン] 5%ブドウ糖液 50mL	2瓶 2A 1瓶		10:45	10:45					
04	末梢静脈側管 点滴静注で 30分かけて カイプロリス点滴静注用「40mg」 注射用水 100mL 5%ブドウ糖液 100mL 薬剤注入量分5%Glu廃棄。	56mg 1瓶 1瓶	/m ²	11:00	11:00					
05	末梢静脈側管 点滴静注で 5%ブドウ糖液 50mL フラッシュ	1瓶		11:30	11:30					
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

レジメンNo. 21-IG019

休薬期間 6日

最大回数 1回

レジメン名称 ★(s.c.)DKd療法(2サイクル)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
01	皮下注 皮下注射 3～5分かけて ダラキューロ配合皮下注(1800mg-15mL)	1800mg	/Body	10:00						
06	持続末梢静脈 維持ルートから 5% ブドウ糖液 100mL ルートへ	1瓶		10:15	10:15					
07	末梢静脈側管 点滴静注で 15分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カ'ロン] デキサート注射液(1.65mg-0.5mL)[デ'カ'ロン] 5% ブドウ糖液 50mL	2瓶 2A 1瓶		10:45	10:45					
08	末梢静脈側管 点滴静注で 30分かけて カイプロリス点滴静注用「40mg」 注射用水 100mL 5% ブドウ糖液 100mL 薬剤注入量分5%Glu廃棄。	56mg 1瓶 1瓶	/m ²	11:00	11:00					
09	末梢静脈側管 点滴静注で 5% ブドウ糖液 50mL フラッシュ	1瓶		11:30	11:30					
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

2021/11/26 09:06

3 / 4

レジメンNo. 21-IG019

休薬期間 6日

最大回数 1回

レジメン名称 ★(s.c.)DKd療法(2サイクル)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(15)	day(16)	day(17)	day(18)	day(19)	day(20)	day(21)
01	皮下注 皮下注射 3～5分かけて ダラキューロ配合皮下注(1800mg-15mL)	1800mg	/Body	10:00						
10	持続末梢静脈 維持ルートから 5% ブドウ糖液 100mL ルートキープ	1瓶		10:15	10:15					
11	末梢静脈側管 点滴静注で 15分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ*カ*ロン] デキサート注射液(1.65mg-0.5mL)[デ*カ*ロン] 5% ブドウ糖液 50mL	2瓶 2A 1瓶		10:45	10:45					
12	末梢静脈側管 点滴静注で 30分かけて カイプロリス点滴静注用「40mg」 注射用水 100mL 5% ブドウ糖液 100mL 薬剤注入量分5%Glu廃棄。	56mg 1瓶 1瓶	/m ²	11:00	11:00					
13	末梢静脈側管 点滴静注で 5% ブドウ糖液 50mL フラッシュ	1瓶		11:30	11:30					
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 血液腫瘍内科	分類 MM	2021/11/26 09:06	4 / 4
レジメンNo. 21-IG019	休薬期間 6日	最大回数 1回	
レジメン名称 ★(s.c.)DKd療法(2サイクル)			

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量	速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
01	皮下注 皮下注射 3 ～ 5 分かけて ダラキューロ配合皮下注 (1800mg－ 1.5 m L)	1800mg	/Body	10:00						
―― 終了 ――										
										</

レジメン参照情報

【併用薬】

- ・デキサメタゾン錠:40mg day22
- ・アセトアミノフェン:600-1000mg day1、8、15、22
- ・d-クロルフェニラミン:2mg day1、8、15、22

【投与上の注意】

- ・ダラツムマブ皮下注:臍から左又は右に約 7.5cm の腹部皮下に投与

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

2021/11/26 09:06

1 / 3

レジメンNo. 21-IG020

休薬期間 12日

最大回数 4回

レジメン名称 ★(s.c.)DKd療法(3-6サイクル)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	皮下注 皮下注射 3～5分かけて ダラキューロ配合皮下注(1800mg-15mL)	1800mg	/Body	10:00						
02	持続末梢静脈 維持ルートから 5%ブドウ糖液 100mL ルートキープ	1瓶		10:15	10:15					
03	末梢静脈側管 点滴静注で 15分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カ'ロン] デキサート注射液(1.65mg-0.5mL)[デ'カ'ロン] 5%ブドウ糖液 50mL	2瓶 2A 1瓶		10:45	10:45					
04	末梢静脈側管 点滴静注で 30分かけて カイプロリス点滴静注用「40mg」 注射用水 100mL 5%ブドウ糖液 100mL 薬剤注入量分5%Glu廃棄。	56mg 1瓶 1瓶	/m ²	11:00	11:00					
05	末梢静脈側管 点滴静注で 5%ブドウ糖液 50mL フラッシュ	1瓶		11:30	11:30					
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

2021/11/26 09:06

2 / 3

レジメンNo. 21-IG020

休薬期間 12日

最大回数 4回

レジメン名称 ★(s.c.)DKd療法(3-6サイクル)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
06	持続末梢静脈維持ルートから 5%ブドウ糖液 100ml ルートケア	1瓶		10:15	10:15					
07	末梢静脈側管 点滴静注で 15分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デカトロン] デキサート注射液(1.65mg-0.5mL)[デカトロン] 5%ブドウ糖液 50ml	2瓶 2A 1瓶		10:45	10:45					
08	末梢静脈側管 点滴静注で 30分かけて カイプロリス点滴静注用「40mg」 注射用水 100ml 5%ブドウ糖液 100ml 薬剤注入量分5%Glu廃棄。	56mg 1瓶 1瓶	/m ²	11:00	11:00					
09	末梢静脈側管 点滴静注で 5%ブドウ糖液 50ml フラッシュ	1瓶		11:30	11:30					
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

2021/11/26 09:06

3 / 3

レジメンNo. 21-IG020

休薬期間 12日

最大回数 4回

レジメン名称 ★(s.c.)DKd療法(3-6サイクル)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(15)	day(16)	day(17)	day(18)	day(19)	day(20)	day(21)
01	皮下注 皮下注射 3～5分かけて ダラキューロ配合皮下注(1800mg-15mL)	1800mg	/Body	10:00						
10	持続末梢静脈 維持ルートから 5% ブドウ糖液 100mL ルートキープ	1瓶		10:15	10:15					
11	末梢静脈側管 点滴静注で 15分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カ'ロン] デキサート注射液(1.65mg-0.5mL)[デ'カ'ロン] 5% ブドウ糖液 50mL	29% 2A 1瓶		10:45	10:45					
12	末梢静脈側管 点滴静注で 30分かけて カイプロリス点滴静注用「40mg」 注射用水 100mL 5% ブドウ糖液 100mL 薬剤注入量分5%Glu廃棄。	56mg 1瓶 1瓶	/m ²	11:00	11:00					
13	末梢静脈側管 点滴静注で 5% ブドウ糖液 50mL フラッシュ	1瓶		11:30	11:30					

終了

レジメンコメント(医師専用)

レジメン参照情報

【併用薬】

- ・デキサメタゾン錠:40mg day22
- ・アセトアミノフェン:600-1000mg day1、15
- ・d-クロルフェニラミン:2mg day1、15

【投与上の注意】

- ・ダラツムマブ皮下注:臍から左又は右に約 7.5cm の腹部皮下に投与

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

2021/11/26 09:07

1 / 3

レジメンNo. 21-IG021

休薬期間 12日

最大回数 999回

レジメン名称 ★(s.c.)DKd療法(7サイクル以降)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	皮下注 皮下注射 3～5分かけて ダラキューロ配合皮下注(1800mg-15mL)	1800mg	/Body	10:00						
02	持続末梢静脈 維持ルートから 5% ブドウ糖液 100mL ルートキープ	1瓶		10:15	10:15					
03	末梢静脈側管 点滴静注で 15分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ*カ*ロン] デキサート注射液(1.65mg-0.5mL)[デ*カ*ロン] 5% ブドウ糖液 50mL	2瓶 2A 1瓶		10:45	10:45					
04	末梢静脈側管 点滴静注で 30分かけて カイプロリス点滴静注用「40mg」 注射用水 100mL 5% ブドウ糖液 100mL 薬剤注入量分5%Glu廃棄。	56mg 1瓶 1瓶	/m ²	11:00	11:00					
05	末梢静脈側管 点滴静注で 5% ブドウ糖液 50mL フラッシュ	1瓶		11:30	11:30					
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

2021/11/26 09:07

2 / 3

レジメンNo. 21-IG021

休薬期間 12日

最大回数 999回

レジメン名称 ★(s.c.)DKd療法(7サイクル以降)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
06	持続末梢静脈 維持ルートから 5% ブドウ糖液 100ml ルートキープ	1瓶		10:15	10:15					
07	末梢静脈側管 点滴静注で 15分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カ'ロン] デキサート注射液(1.65mg-0.5mL)[デ'カ'ロン] 5% ブドウ糖液 50ml	2% 2A 1瓶		10:45	10:45					
08	末梢静脈側管 点滴静注で 30分かけて カイプロリス点滴静注用「40mg」 注射用水 100ml 5% ブドウ糖液 100ml 薬剤注入量分5%Glu廃棄。	56mg 1瓶 1瓶	/m ²	11:00	11:00					
09	末梢静脈側管 点滴静注で 5% ブドウ糖液 50ml フラッシュ	1瓶		11:30	11:30					
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 血液腫瘍内科

分類 MM

2021/11/26 09:07

3 / 3

レジメンNo. 21-IG021

休薬期間 12日

最大回数 999回

レジメン名称 ★(s.c.)DKd療法(7サイクル以降)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(15)	day(16)	day(17)	day(18)	day(19)	day(20)	day(21)
10	持続末梢静脈 維持ルートから 5% ブドウ糖液 100ml ルートキープ	1瓶		10:15	10:15					
11	末梢静脈側管 点滴静注で 15分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カ'ロン] デキサート注射液(1.65mg-0.5mL)[デ'カ'ロン] 5% ブドウ糖液 50ml	29% 2A 1瓶		10:45	10:45					
12	末梢静脈側管 点滴静注で 30分かけて カイプロリス点滴静注用「40mg」 注射用水 100ml 5% ブドウ糖液 100ml 薬剤注入量分5%Glu廃棄。	56mg 1瓶 1瓶	/m ²	11:00	11:00					
13	末梢静脈側管 点滴静注で 5% ブドウ糖液 50ml フラッシュ	1瓶		11:30	11:30					

終了

レジメンコメント(医師専用)

レジメン参照情報

【併用薬】

- ・デキサメタゾン錠:40mg day22
- ・アセトアミノフェン:600-1000mg day1
- ・d-クロルフェニラミン:2mg day1

【投与上の注意】

- ・ダラツムマブ皮下注:臍から左又は右に約 7.5cm の腹部皮下に投与