

診療科 呼吸器内科

分類 NSCLCその他

2021/11/26 09:08

1 / 1

レジメンNo. 18-IP006

休薬期間 20日

最大回数 8回

レジメン名称 ★CBDCA+PEM+Pembrolizumab療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL (フソー) 100m l ルートキープ	1瓶		09:30						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 30 分かけて キイトルーダ点滴静注「100mg-4mL」 生理食塩液PL (フソー) 100m l 最終濃度1~10mg/mL。インラインフィルター使用。	200mg 1瓶	/Body	10:00						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 200m l / h / 30 分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」 [デ'カ'ロン] デキサート注射液 (1.65mg-0.5mL) [デ'カ'ロン] グラニセトロン静注液 (3mg-3mL) [カイトリル] 生理食塩液PL (フソー) 100m l	1% 2A 1A 1瓶		10:30						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 10 分かけて ヘ'マト'レ'セ'ト'点滴静注液「500mg-20mL」 [ア'リ'ム'タ'] 生理食塩液PL (フソー) 100m l 薬剤注入量分、生食破棄。	500mg 1瓶	/m ²	11:00						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 60 分かけて カ'ル'シ'ラ'チ'ン点滴静注液<450mg-45mL> [ハ'ラ'フ'ラ'チ'ン] 5% ブドウ糖液 250m l	5mg 1袋	/GFR+25	11:10						
06	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) 50m l フラッシュ	1瓶		12:10						
終了										

レジメンコメント(医師専用)

レジメン参照情報

【併用薬】

1).葉酸:ペムレキセド初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与し、なお、本剤の投与を中止又は終了する場合には、ペムレキセド最終投与日から22日目まで可能な限り葉酸を投与する。

2).ビタミンB12:ペムレキセド初回投与の少なくとも7日前に、ビタミンB12として1回1mgを筋肉内投与し、その後、ペムレキセド投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。

【併用薬(推奨)】

- ・アプレヒタントカプセル:125mg day1
- ・アプレヒタントカプセル:80mg day2-3
- ・デキサメタゾン錠:8mg day2-4