

診療科 呼吸器内科

分類 NSCLCその他

2021/11/26 09:08

1 / 1

レジメンNo. 18-IP007

休業期間 20日

最大回数 999回

レジメン名称 ★PEM+Pembrolizumab療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL (フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		09:30						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 30分かけて キイトルーダ点滴静注「100mg-4mL」 生理食塩液PL (フソー) 100ml 最終濃度1~10mg/mL。インラインフィルター使用。	200mg 1瓶	/Body	10:00						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/30分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カト'ロン] 生理食塩液PL (フソー) 100ml	1瓶 1瓶		10:30						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 10分かけて ヘ'マトレ'ト'点滴静注「500mg-20mL」[アリムタ] 生理食塩液PL (フソー) 100ml 薬剤注入量分、生食破棄。	500mg 1瓶	/m ²	11:00						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		11:10						

終了

レジメンコメント(医師専用)

レジメン参照情報

【併用薬】

1).葉酸:ペムレキセド初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与し、なお、本剤の投与を中止または終了する場合には、ペムレキセド最終投与日から22日目まで可能な限り葉酸を投与する。

2).ビタミンB12:ペムレキセド初回投与の少なくとも7日前に、ビタミンB12として1回1mgを筋肉内投与し、その後、ペムレキセド投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。