

診療科 呼吸器外科

分類 肺癌等

2021/11/26 09:08

1 / 1

レジメンNo. 09-ST0011

休薬期間 6日

最大回数 999回

レジメン名称 NDP+VNR療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL (フソー) 100m l ルートキープ	100m l	1瓶	13:30						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 全開で デキサート注射液 (1.65mg-0.5mL) [デ'カ'ロン] デキサート注射液「6.6mg-2mL」 [デ'カ'ロン] パロノセトロン静注 (0.75mg-5mL/V) [アロキシ] 生理食塩液PL (フソー) 100m l		2A 1瓶 1瓶 1瓶	14:00						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 10分かけて ロゼウス静注液 (10mg-1mL) [カ'ル'ビ'ン] 生理食塩液PL (フソー) 100m l	10mg 100m l	/m ² 1瓶	14:10						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 90分かけて アクブラ静注用 (10mg) 生理食塩液PL (フソー) 500m l	30mg 500m l	/m ² 1瓶	14:20						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) 50m l フラッシュ	50m l	1瓶	15:50						
終了										

レジメンコメント(医師専用)

レジメン参照情報

【併用薬(推奨)】

・デキサメタゾン錠:8mg day2-3