

診療科 呼吸器内科

分類 SCLC標準初回

1 / 1

レジメンNo. 19-IP014

休薬期間 18日

最大回数 4回

レジメン名称 ★CBDCA+Etoposide+Atezolizumab療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL (フソー) 100mL ルートキープ	1瓶		09:30	10:30	10:30				
02	末梢静脈側管 点滴静注で 60分かけて テセントリク点滴静注「1200mg-20mL」 1200mg /Body 生理食塩液ソトパック (大塚) 250mL 1袋 初回60分、問題なければ2回目以降30分投与可。インラインフィルター使用。			10:00						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 30分かけて ラモセトロン塩酸塩注射液(0.3mg-2mL) [テア] 0.3mg デキサート注射液(1.65mg-0.5mL) [テカトロン] 2A デキサート注射液「6.6mg-2mL」 [テカトロン] 1袋 生理食塩液PL (フソー) 100mL 1瓶			11:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 30分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」 [テカトロン] 1袋 生理食塩液PL (フソー) 100mL 1瓶				11:00	11:00				
05	末梢静脈側管 点滴静注で 60分かけて エトポシド点滴静注(100mg-5mL) [ラステット] 100mg /m ² 5% ブドウ糖液 250mL 1袋			11:30	11:30	11:30				
06	末梢静脈側管 点滴静注で 60分かけて カルバプラチン点滴静注液<450mg-45mL> [ハアラチン] 5mg /GFR+25 5% ブドウ糖液 250mL 1袋			12:30						
07	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) 50mL 1瓶 フラッシュ			13:30	12:30	12:30				
終了										

レジメンコメント(医師専用)