

診療科 呼吸器内科

分類 NSCLC標準初回

1 / 3

レジメンNo. 13-IP001

休薬期間 6日

最大回数 999回

レジメン名称 CBDCA+nab-PTX

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL (フソー) 100m l ルートキープ	100m l	1瓶	09:30						
02	持続末梢静脈 維持ルートから 30分かけて ラモセトロン塩酸塩注射液(0.3mg-2mL) [ナゼ7 デキサート注射液「6.6mg-2mL」 [デキサドロン] 生理食塩液PL (フソー) 100m l	0.3mg 3分 100m l	0.3mg 3分 1瓶	10:00						
03	持続末梢静脈 維持ルートから 30分かけて アブラキサン点滴静注用 (100mg) 生理食塩液PL (フソー) 50m l 1Vにつき生食20mLで溶解、残りの生食廃棄し、空ボトルにつめる	100mg 1m l	/m ²	10:30						
04	持続末梢静脈 維持ルートから 30分かけて 生理食塩液PL (フソー) 50m l	50m l	1瓶	11:00						
05	持続末梢静脈 維持ルートから 60分かけて カルボプラチン点滴静注液<450mg-45mL> [パブラチン 5% ブドウ糖液 250m l	6mg 1袋	/GFR+25	11:30						
06	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL (フソー) 50m l フラッシュ	50m l	1瓶	12:30						
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 呼吸器内科

分類 NSCLC標準初回

2 / 3

レジメンNo. 13-IP001

休薬期間 6日

最大回数 999回

レジメン名称 CBDCA+n a b-P T X

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液P L (フソー) 1 0 0 m l ルートキープ		1瓶	09:30						
02	持続末梢静脈 維持ルートから 3 0 分かけて ラモセトロン塩酸塩注射液 (0. 3mg-2mL) [ラセ 7 0. 3mg デキサート注射液「6. 6mg-2mL」 [デカド 3分 生理食塩液P L (フソー) 1 0 0 m l 1瓶			10:00						
03	持続末梢静脈 維持ルートから 3 0 分かけて アブラキサン点滴静注用 (1 0 0 m g) 100mg /m ² 生理食塩液P L (フソー) 5 0 m l 1ml 1 Vにつき生食20mLで溶解、残りの生食廃棄し、空ボトルにつめる			10:30						
07	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液P L (フソー) 5 0 m l 1瓶 フラッシュ			11:00						
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 呼吸器内科

分類 NSCLC標準初回

3 / 3

レジメンNo. 13-IP001

休薬期間 6日

最大回数 999回

レジメン名称 CBDCA+nab-PTX

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(15)	day(16)	day(17)	day(18)	day(19)	day(20)	day(21)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL（フソー） ルートキープ	100mL	1瓶	09:30						
02	持続末梢静脈 維持ルートから 30分かけて ラモセトロン塩酸塩注射液(0.3mg-2mL) [ナセ7] デキサート注射液「6.6mg-2mL」 [デカドロン] 生理食塩液PL（フソー）	0.3mg 3mg 100mL	0.3mg 3mg 1瓶	10:00						
03	持続末梢静脈 維持ルートから 30分かけて アブラキサン点滴静注用（100mg） 生理食塩液PL（フソー） 1Vにつき生食20mLで溶解、残りの生食廃棄し、空ボトルにつめる	100mg 50mL	100mg 1mL	10:30						
07	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL（フソー） フラッシュ	50mL	1瓶	11:00						
終了										

レジメンコメント(医師専用)