

診療科 呼吸器内科

分類 NSCLC標準初回

1 / 1

レジメンNo. 09-IP008

休薬期間 20日

最大回数 99回

レジメン名称 CBDCA+PTX療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液P.L.(フソー) 100mL ルートキープ	1瓶		09:30						
02	持続末梢静脈 維持ルートから 30分かけて ラモセトロン塩酸塩注射液(0.3mg-2mL)[ナセア] 0.3mg デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デカドロン] 3% ポララミン(5mg) 2A 生理食塩液P.L.(フソー) 100mL 1瓶			10:00						
03	持続末梢静脈 維持ルートから 30分かけて ガスター注射液「20mg-2mL」 生理食塩液P.L.(フソー) 100mL	1A 1瓶		10:30						
04	持続末梢静脈 維持ルートから 180分かけて パクリタキセル注「100mg-16.7mL」[タキソール] 生理食塩液P.L.(フソー) 500mL 185~220mg/m ² 、インラインフィルターを使用。	185mg 1瓶	/m ²	11:00						
05	持続末梢静脈 維持ルートから 60分かけて カルバマゼピン点滴静注液<450mg-45mL>[パファリン] 5%ブドウ糖液 250mL	5mg 1袋	/GFR+25	14:00						
06	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液P.L.(フソー) 50mL フラッシュ	1瓶		15:00						
終了										

レジメンコメント(医師専用)