

診療科 呼吸器内科

分類 外来NSCLC

1 / 1

レジメンNo. 16-IP005

休薬期間 20日

最大回数 999回

レジメン名称 Docetaxel+Ramucirumab療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL(フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		09:15						
02	持続末梢静脈 維持ルートから 400ml/h/15分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デカトロン] ポララミン(5mg) 生理食塩液PL(フソー) 100ml	1瓶 1A 1瓶		09:45						
03	持続末梢静脈 維持ルートから 250ml/h/60分かけて サイラムザ点滴静注「500mg-50mL」 生理食塩液ソフトバッグ(大塚) 250ml 薬剤注入量分、生食廃棄。インラインフィルタ使用。	10mg 1袋	/kg	10:00						
04	持続末梢静脈 維持ルートから 全開で 生理食塩液PL(フソー) 50ml	1瓶		11:00						
05	持続末梢静脈 維持ルートから 250ml/h/60分かけて ドセタキセル点滴静注「80mg-4mL」[タキセル] 5%ブドウ糖液 250ml	60mg 1袋	/m ²	11:05						
06	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		12:05						

終了

レジメンコメント(医師専用)