

診療科 呼吸器内科

分類 NSCLCその他

1 / 1

レジメンNo. 17-IP001

休薬期間 20日

最大回数 99回

レジメン名称 Pembrolizumab療法

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント                                                                                               | 1回投与量       | 速度指示  | day ( 1 ) | day ( 2 ) | day ( 3 ) | day ( 4 ) | day ( 5 ) | day ( 6 ) | day ( 7 ) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01   | 持続末梢静脈 維持ルートから<br>生理食塩液P L (フソー) 100m l<br>ルートキープ                                                         | 1瓶          |       | 10:00     |           |           |           |           |           |           |
| 02   | 持続末梢静脈 維持ルートから<br>30分かけて<br>キイトルーダ点滴静注「100mg-4mL」<br>生理食塩液P L (フソー) 100m l<br>最終濃度1~10mg/mL。インラインフィルター使用。 | 200mg<br>1瓶 | /Body | 10:30     |           |           |           |           |           |           |
| 03   | 持続末梢静脈 維持ルートから<br>生理食塩液P L (フソー) 50m l<br>フラッシュ                                                           | 1瓶          |       | 11:00     |           |           |           |           |           |           |
| 終了   |                                                                                                           |             |       |           |           |           |           |           |           |           |

レジメンコメント(医師専用)