

診療科 呼吸器内科

分類 SCLCその他

1 / 1

レジメンNo. 09-IP028

休薬期間 16日

最大回数 99回

レジメン名称 TPT療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL（フソー） ルートキープ	100ml	1瓶	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30		
02	持続末梢静脈 維持ルートから 30分かけて ラモセトロン塩酸塩注射液(0.3mg-2mL) [ラセア] デキサート注射液(1.65mg-0.5mL) [デカトロン] 生理食塩液PL（フソー）	0.3mg 2A 100ml	1瓶	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00		
03	持続末梢静脈 維持ルートから 30分かけて ハイカムチン注射用（1.1mg） 生理食塩液PL（フソー） 0.5~1.2mg/m ²	0.5mg 1瓶	/m ²	10:30	10:30	10:30	10:30	10:30		
04	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL（フソー） フラッシュ	50ml	1瓶	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00		
終了										

レジメンコメント(医師専用)