

診療科 一般外科

分類 大腸癌：進行再発Irinotecan

1 / 1

レジメンNo. 19-SG024

休薬期間 20日

最大回数 999回

レジメン名称 ★CAPIRI療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL (フソー) ルートキープ	100ml	1瓶	09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml / h / 30 分かけて デキサート注射液 (1.65mg-0.5mL) [デ'カ'ロン] デキサート注射液「6.6mg-2mL」 [デ'カ'ロン] アロキシ静注 (0.75mg-5ml) 生理食塩液PL (フソー) 50ml		2A 1瓶 1瓶 1瓶	09:30						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 90 分かけて イリテカン塩酸塩点滴静注液「100mg-5mL」 [イ'テ'カン] 5% ブドウ糖注PL 500ml		150mg /m ² 1瓶	10:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) フラッシュ	50ml	1瓶	11:30						
終了										
レジメンNo. 19-SG024 レジメン名称 ★CAPIRI療法 レジメン参照情報 【併用薬】 ・カベンタシン錠:1600mg/m²/day day1夕-day15朝 【併用薬(推奨)】 ・デキサメタゾン錠:8mg day2-3 または ・アプレミタントカプセル:125mg day1 ・アプレミタントカプセル:90mg day2-3 ※デキサメタゾン注射液 (day1) (は4.95mgへ減量 【適用上の注意】 大腸癌治療ガイドライン2019年版では、 Irinotecanは、200mg/m²とされているが、 安全性を考慮し、東海大学消化器外科では、 Irinotecanを、150mg/m²とした。										
レジメンコメント(医師専用)										