

診療科 一般外科

分類 大腸班：その他

1 / 1

レジメンNo. 19-SG037

休薬期間 6日

最大回数 1回

レジメン名称 Cetuximab療法 (1サイクル)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL (フソー) 100ml ルートキープ	100ml	1瓶	09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/30分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カ'ロン] ポララミン (5mg) 生理食塩液PL (フソー) 50ml		1瓶 2A 1瓶	09:30						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 125ml/h/120分かけて アービタックス注射液 (100mg-20ml) 生理食塩液ソフトバッグ (大塚) 250ml ポンプ使用。薬剤注入量分、生食廃棄。	400mg 1袋	/m ²	10:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) 50ml フラッシュ	50ml	1瓶	12:00						
—— 終了 ——										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 一般外科		分類 大腸班：その他		1 / 1						
レジメンNo. 19-SG038		休薬期間 6日		最大回数 999回						
レジメン名称 Cetuximab療法 (2サイクル～)										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL (フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		09:30						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/30 分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」 [デ'カ'ロン] ポララミン (5mg) 生理食塩液PL (フソー) 50ml	1瓶 2A 1瓶		10:00						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 250ml/h/60 分かけて アービタックス注射液 (100mg-20ml) 生理食塩液ワトハ'ック' (大塚) 250ml ポンプ 使用。薬剤注入量分、生食廃棄。	250mg 1袋	/ml	10:30						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		11:30						
―― 終了 ――										
レジメンコメント (医師専用)										