

診療科 一般外科

分類 大腸癌：進行再発Irinotecan

1 / 1

レジメンNo. 19-SG009

休薬期間 13日

最大回数 999回

レジメン名称 FOLFIRI+Aflibercept Beta療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL (フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		08:50						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/30分かけて デキサート注射液(1.65mg-0.5mL) [デ'カ'ロン] デキサート注射液「6.6mg-2mL」 [デ'カ'ロン] アロキシ静注 (0.75mg-5mL) 生理食塩液PL (フソー) 50ml	2A 1% 1% 1瓶		09:20						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 60分かけて ザルトラップ点滴静注(100mg-4mL/V) 生理食塩液PL (フソー) 100ml インラインフィルター使用	4mg 1瓶	/kg	09:50						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		10:50						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 125ml/h/120分かけて アイソボリン点滴静注用「100mg」 5%ブドウ糖液 250ml リナテカと同時に投与	200mg 1袋	/m ²	11:00						
06	末梢静脈側管 点滴静注で 90分かけて リナテカ塩酸塩点滴静注「100mg-5mL」 [リ'ネ'カ] 5%ブドウ糖液PL 500ml アイソボリンと同時に投与	150mg 1瓶	/m ²	11:00						
07	末梢静脈側管 点滴静注で 全開で 5-FU注 (250mg-5mL) 5%ブドウ糖液 50ml	400mg 1瓶	/m ²	13:00						
08	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		13:10						
09	末梢静脈側管 点滴静注で 2.5ml/h/46時間かけて 5-FU注 (250mg-5mL) 5%ブドウ糖液 100ml 5%ブドウ糖液で合計115mlに。バクスターインフューザー-SV2.5	2400mg 1瓶	/m ²	13:20						
終了										

レジメンコメント(医師専用)