

診療科 一般外科

分類 大腸癌：進行再発Irinotecan

1 / 1

レジメンNo. 19-SG008

休薬期間 13日

最大回数 999回

レジメン名称 FOLFIRI+Ramucirumab療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL(フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/30 分かけて デキサート注射液(1.65mg-0.5mL) [デ'カ'ロン] デキサート注射液「6.6mg-2mL」 [デ'カ'ロン] アロキシ静注(0.75mg-5mL) ポラミン(5mg) 生理食塩液PL(フソー) 50ml	2A 1瓶 1瓶 1A 1瓶		09:30						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 250ml/h/60 分かけて サイラムザ点滴静注液「500mg-50mL」 生理食塩液ソフトバッグ(大塚) 250ml 薬剤注入量分、生食廃棄。インラインフィルター使用。	8mg 1袋	/kg	10:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		11:00						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 125ml/h/120分かけて アイソボリン点滴静注用「100mg」 5% ブドウ糖液 250ml イリリカと同時に投与	200mg 1袋	/m ²	11:10						
06	末梢静脈側管 点滴静注で 90 分かけて イリリカ塩酸塩点滴静注液「100mg-5mL」 [イ'リ'リ'カ] 5% ブドウ糖液PL 500ml アイソボリンと同時に投与	150mg 1瓶	/m ²	11:10						
07	末梢静脈側管 点滴静注で 全開で 5-FU注(250mg-5mL) 5% ブドウ糖液 50ml	400mg 1瓶	/m ²	13:10						
08	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		13:20						
09	末梢静脈側管 点滴静注で 2.5ml/h/46時間かけて 5-FU注(250mg-5mL) 5% ブドウ糖液 100ml 5%ブドウ糖液で合計115mlに。ハ'ク'ス'ター'イン'フ'ュー'ザ'-SV2.5	2400mg 1瓶	/m ²	13:30						
終了										

レジメンコメント(医師専用)