

診療科 一般外科 分類 肝胆膵班

1 / 1

レジメンNo. 13-SG0121

休薬期間 13日

最大回数 999回

レジメン名称 ★FOLFIRINOX療法（外来用）

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL（フソー） 100ml ルートキープ	1瓶		00:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/30分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デカトロン] 1瓶 デキサート注射液(1.65mg-0.5mL)[デカトロン] 2A アロキシ静注（0.75mg-5ml） 1瓶 生理食塩液PL（フソー） 50ml 1瓶			00:00						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 125ml/h/120分かけて オキサリプラチン点滴静注液「100mg-20mL」[エルプラチン] 5%ブドウ糖液 250ml	85mg 1袋	/㎡	00:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 125ml/h/120分かけて アイソボリン点滴静注用「100mg」 5%ブドウ糖液 250ml オキサリプラチン終了後、アイソボリンと同時に投与	200mg 1袋	/㎡	00:00						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 90分かけて イリナカン塩酸塩点滴静注液「100mg-5mL」[イトーシン] 5%ブドウ糖注PL 500ml オキサリプラチン終了後、アイソボリンと同時に投与	180mg 1瓶	/㎡	00:00						
06	末梢静脈側管 点滴静注で 全開で 5-FU注（250mg-5mL） 5%ブドウ糖液 50ml	400mg 1瓶	/㎡	00:00						
07	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL（フソー） 50ml フラッシュ	1瓶		00:00						
08	末梢静脈側管 点滴静注で 2.5ml/h/46時間かけて 5-FU注（250mg-5mL） 5%ブドウ糖液 100ml 5%ブドウ糖液で合計115mlに。ハクスターインフューザー-SV2.5	2400mg 1瓶	/㎡	00:00						
終了										

レジメンコメント(医師専用)