

診療科 一般外科

分類 肝胆脾班

1 / 1

レジメンNo. 12-SG0121

休薬期間 6日

最大回数 999回

レジメン名称 GEM+CDDP療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 500ml/h/60 分かけて 生理食塩液PL(フロー) 500ml 硫酸Mg補正液(20mEq-20ml)	1瓶	1A	10:00						
02	持続末梢静脈 維持ルートから 500ml/h/120分かけて 生理食塩液バッグ(フロー) 1000ml	1袋		11:00						
03	末梢静脈側管点滴静注で 全開で デキサート注射液「6.6mg-2mL」[テ'カド'ロン] 1瓶 デキサート注射液(1.65mg-0.5mL)[テ'カド'ロン] 2A アロキシ静注(0.75mg-5ml) 1瓶 生理食塩液PL(フロー) 100ml	1瓶	1A	10:40						
04	末梢静脈側管点滴静注で 400ml/h/30 分かけて マンニットールS 300ml	200ml		10:50						
05	末梢静脈側管点滴静注で 500ml/h/60 分かけて シスプラチニ注入(10mg-20mL)[ブ'リブ'ラチン] 25mg/m ² 生理食塩液PL(フロー) 500ml 薬剤注入量分、生食破棄。	1瓶		11:20						
06	末梢静脈側管点滴静注で 500ml/h/30 分かけて ケムシタピン点滴静注液「1000mg-25mL」[シ'エムザ'ール] 1000mg/m ² 5% ブドウ糖液 250ml	1袋		12:20						
07	末梢静脈側管点滴静注で 生理食塩液PL(フロー) 50ml フラッシュ	1瓶		12:50						
終了										

レジメンコメント(医師専用)