

診療科 一般外科

分類 胃班

1 / 1

レジメンNo. 11-SG0011

休薬期間 13日

最大回数 999回

レジメン名称 Irinotecan療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液P L (フソー) 100m l ルートキープ	1瓶		09:20						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 全開で デキサート注射液(1.65mg-0.5mL) [デ [®] カ [®] ロン] デキサート注射液「6.6mg-2mL」 [デ [®] カ [®] ロン] アロキシ静注 (0.75mg-5m l) 生理食塩液P L (フソー) 100m l	2A 1% 1% 1瓶		09:50						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 90 分かけて イリノカン塩酸塩点滴静注液「100mg-5mL」 [トホ [®] テン 5% ブドウ糖注P L 500m l	150mg 1瓶	/m ²	10:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液P L (フソー) 50m l フラッシュ	1瓶		11:30						
— 終了 —										

レジメンコメント(医師専用)