

診療科 一般外科

分類 大腸癌：進行再発Irinotecan

1 / 1

レジメンNo. 19-SG018

休薬期間 13日

最大回数 999回

レジメン名称 Irinotecan+Panitumumab療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL (フソー) 100ml ルートキープ	100ml	1瓶	09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/30 分かけて デキサート注射液(1.65mg-0.5mL) [デ'カ'ロン] デキサート注射液「6.6mg-2mL」 [デ'カ'ロン] アロキシ静注 (0.75mg-5ml) 生理食塩液PL (フソー) 50ml		2A 1瓶 1瓶 1瓶	09:30						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/60 分かけて ベクティビックス点滴静注(100mg-5ml) 生理食塩液PL (フソー) 100ml インラインフィルター使用		6mg /kg 1瓶	10:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 全開で 生理食塩液PL (フソー) 50ml		1瓶	11:00						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 90 分かけて リ/テカン塩酸塩点滴静注液「100mg-5mL」 [ト'ホ'テシ 5% ブドウ糖注PL 500ml		150mg /m ² 1瓶	11:10						
06	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) 50ml フラッシュ		1瓶	12:40						
終了										

レジメンコメント(医師専用)