

診療科 一般外科		分類 大腸班：進行再発Irinotecan		1 / 1						
レジメンNo. 19-SG017		休薬期間 13日		最大回数 999回						
レジメン名称 ★IRIS+Panitumumab療法(q4w)										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	持続末梢静脈維持ルートから 生理食塩液PL(フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/30 分かけて デキサート注射液(1.65mg-0.5ml) [デ'カ'ロン] デキサート注射液「6.6mg-2ml」 [デ'カ'ロン] アロキシ静注(0.75mg-5ml) 生理食塩液PL(フソー) 50ml	2A 1瓶 1瓶 1瓶		09:30						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/60 分かけて ベクティビックス点滴静注「400mg-20ml」 生理食塩液PL(フソー) 100ml インリンフィルター使用	6mg 1瓶	/kg	10:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 全開で 生理食塩液PL(フソー) 50ml	1瓶		11:00						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 90 分かけて イリテカン塩酸塩点滴静注「100mg-5ml」 [イ'テ'カン] 5% ブドウ糖注PL 500ml	100mg 1瓶	/m ²	11:10						
06	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		12:40						
終了										
レジメンNo.	19-SG017									
レジメン名称	★IRIS+Panitumumab療法(q4w)									
レジメン参照情報										
【併用薬】 *S-1:80-150mg/day day1夕-day15朝										
【併用薬(推奨)】 *デキサメタゾン錠:8mg day2-3										
または *ア'レ'ビ'タ'ン'カ'セ'ル:125mg day1 *ア'レ'ビ'タ'ン'カ'セ'ル:80mg day2-3 ※デキサメタゾン注射液(day1)は4.95mgへ減量										
レジメンコメント(医師専用)										