

診療科 一般外科

分類 大腸班：補助療法

1 / 1

レジメンNo. 19-SG004

休薬期間 13日

最大回数 999回

レジメン名称 mFOLFOX6療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	一般中心静脈 維持ルートから 生理食塩液PL（フソー） ルートキープ	100ml	1瓶	09:00						
02	中心静脈側管 点滴静注で 100ml/h/30分かけて デキサート注射液(1.65mg-0.5mL) [デカトロン] デキサート注射液「6.6mg-2mL」 [デカトロン] アロキシ静注（0.75mg-5mL） 生理食塩液PL（フソー） 50ml		2A 1% 1% 1瓶	09:30						
03	中心静脈側管 点滴静注で 125ml/h/120分かけて アイソボリン点滴静注用「100mg」 5%ブドウ糖液 250ml オキサリプラチンと同時に投与。	200mg 1袋	/m ²	10:00						
04	中心静脈側管 点滴静注で 125ml/h/120分かけて オキサリプラチン点滴静注液「100mg-20mL」 [エルプラチン] 5%ブドウ糖液 250ml ポンプ使用、アイソボリンと同時に投与。	85mg 1袋	/m ²	10:00						
05	中心静脈側管 点滴静注で 全開で 5-FU注（250mg-5mL） 5%ブドウ糖液 50ml	400mg 1瓶	/m ²	12:00						
06	中心静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL（フソー） 50ml フラッシュ	1瓶		12:10						
07	中心静脈側管 点滴静注で 5-FU注（250mg-5mL） 5%ブドウ糖液 100ml 5%ブドウ糖液で合計115mlに、パラスターインフューザー-SV2.5	2400mg 1瓶	/m ²	12:20						
終了										

レジメンコメント(医師専用)