

診療科 一般外科

分類 大腸癌：進行再発Oxaliplatin

1 / 1

レジメンNo. 19-SG030

休薬期間 13日

最大回数 999回

レジメン名称 mFOLFOX6+Panitumumab療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	一般中心静脈 維持ルートから 生理食塩液PL (フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		09:00						
02	中心静脈側管 点滴静注で 100ml/h/30分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デカトロン] 1% デキサート注射液(1.65mg-0.5mL)[デカトロン] 2A アロキシ静注(0.75mg-5ml) 1% 生理食塩液PL (フソー) 50ml 1瓶			09:30						
03	中心静脈側管 点滴静注で 100ml/h/60分かけて ベクティビックス点滴静注「400mg-20ml」 6mg/kg 生理食塩液PL (フソー) 100ml 1瓶 インラインフィルター使用。			10:00						
04	中心静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) 50ml 1瓶 フラッシュ			11:00						
05	中心静脈側管 点滴静注で 125ml/h/120分かけて アイソボリン点滴静注用「100mg」 200mg/m ² 5%ブドウ糖液 250ml 1袋 オキサリプラチンと同時に投与。			11:10						
06	中心静脈側管 点滴静注で 125ml/h/120分かけて オキサリプラチン点滴静注「100mg-20mL」[エルプラチン] 85mg/m ² 5%ブドウ糖液 250ml 1袋 アイソボリンと同時投与。ポンプ使用。			11:10						
07	中心静脈側管 点滴静注で 全開で 5-FU注「1000mg-20mL」 400mg/m ² 5%ブドウ糖液 50ml 1瓶			13:10						
08	中心静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) 50ml 1瓶 フラッシュ			13:20						
09	中心静脈側管 点滴静注で 2.5ml/h/46時間かけて 5-FU注「1000mg-20mL」 2400mg/m ² 5%ブドウ糖液 100ml 1瓶 5%ブドウ糖液で合計115mlに。パニツマムアブ-SV2.5。			13:30						
終了										

レジメンコメント(医師専用)