

診療科 一般外科

分類 肝胆膵班

1 / 1

レジメンNo. 14-SG0071

休薬期間 6日

最大回数 999回

レジメン名称 nab-PTX+GEM療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液P L (フソー) 100m l ルートキープ	1瓶		10:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 100m l / h / 30 分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ [®] カ [®] ト [®] ン] デキサート注射液(1.65mg-0.5mL)[デ [®] カ [®] ト [®] ン] グラニセトロン静注液(3mg-3mL)[カイトリル] 生理食塩液P L (フソー) 50m l	1瓶 2A 1A 1瓶		10:30						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 30 分かけて アブラキサン点滴静注用(100mg) 生理食塩液P L (フソー) 100m l 1Vにつき生食20mLで溶解、残りの生食廃棄し、空ボトルにつめる	125mg 1m l	/m l	11:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 全開で 生理食塩液P L (フソー) 50m l	1瓶		11:30						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 500m l / h / 30 分かけて ゲムシタ [®] 点滴静注液「1000mg-25mL」[ジ [®] エムザ [®] ール] 5% ブドウ糖液 250m l	1000mg 1袋	/m l	11:35						
06	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液P L (フソー) 50m l フラッシュ	1瓶		12:05						
終了										

レジメンコメント(医師専用)