

診療科 一般外科		分類 大腸班：進行再発Irinotecan		1 / 1						
レジメンNo. 19-SG022		休薬期間 20日		最大回数 999回						
レジメン名称 ★SIR療法(q3w)										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	持続末梢静脈維持ルートから 生理食塩液PL(フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		09:00						
02	末梢静脈側管点滴静注で 100ml/h/30分かけて デキサート注射液(1.65mg-0.5mL)[デカトロン] デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デカトロン] アロキシ静注(0.75mg-5mL) 生理食塩液PL(フソー) 50ml	2A 1瓶 1瓶 1瓶		09:30						
03	末梢静脈側管点滴静注で 90分かけて イリテカン塩酸塩点滴静注液「100mg-5mL」[トホテシ] 5%ブドウ糖注PL 500ml	150mg 1瓶	/ml	10:00						
04	末梢静脈側管点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		11:30						
終了										
レジメンNo.	19-SG022									
レジメン名称	★SIR療法(q3w)									
レジメン参照情報										
【併用薬】 ・S-1:80-150mg/day day1夕-day15朝										
【併用薬(推奨)】 ・デキサメタゾン錠:8mg day2-3										
または ・アプレビタントカプセル:125mg day1 ・アプレビタントカプセル:80mg day2-3 ※デキサメタゾン注射液(day1)は4.95mgへ減量										
レジメンコメント(医師専用)										