

診療科 一般外科

分類 大腸癌：進行再発Oxaliplatin

1 / 1

レジメンNo. 19-SG032

休薬期間 20日

最大回数 999回

レジメン名称 ★SOX療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL (フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/30分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カ'ロン] 1瓶 デキサート注射液(1.65mg-0.5mL)[デ'カ'ロン] 2A アロキシ静注 (0.75mg-5ml) 1瓶 生理食塩液PL (フソー) 50ml 1瓶			09:30						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 125ml/h/120分かけて オキサリプラチン点滴静注液「100mg-20mL」[エル'プラット] 130mg /ml 5%ブドウ糖液 250ml 1袋 ポンプ使用。			10:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		12:00						

終了

レジメンNo. 19-SG032
レジメン名称 ★SOX療法

レジメン参照情報

【併用薬】
*S-1: 80-150mg/day day1夕-day15朝【併用量(推奨)】
*デキサメタゾン錠8mg day2-3

または

*ア'レ'ビ'タ'カ'セル125mg day1
*ア'レ'ビ'タ'カ'セル80mg day2-3
※デキサメタゾン注射液(day1)は4.95mgへ減量

レジメンコメント(医師専用)