

診療科 一般外科		分類 大腸癌：進行再発Oxaliplatin		1 / 1						
レジメンNo. 19-SG033		休薬期間 20日		最大回数 999回						
レジメン名称		★SOX+Bevacizumab療法								
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液P L (フソー) 100m l ルートキープ	1瓶		09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 100m l / h / 30 分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ*カ*ト*ン] デキサート注射液(1.65mg-0.5mL)[デ*カ*ト*ン] アロキシ静注(0.75mg-5m l) 生理食塩液P L (フソー) 50m l	1瓶 2A 1瓶 1瓶		09:30						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 90 分かけて アバステン点滴静注用(100mg-4m L) 生理食塩液P L (フソー) 100m l 初回90分、2回目60分、3回目以降30分可、ホ*ソ*使用。	7.5mg 1瓶	/kg	10:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 125m l / h / 120分かけて オキサリ*ラチン点滴静注液「100mg-20mL」[エル*ラ*ット] 5% ブドウ糖液 250m l ホ*ソ*使用。	130mg 1袋	/m ²	11:30						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液P L (フソー) 50m l フラッシュ	1瓶		13:30						
―― 終了 ――										
レジメンNo.	19-SG033									
レジメン名称	★SOX+Bevacizumab療法									
レジメン参照情報										
【併用薬】										
・S-1：80-150mg/day day1夕-day15朝										
【併用薬(推奨)】										
・デキサメタゾン錠8mg day2-3										
または										
・ア*レ*ビ*タ*ン*カ*プ*セル125mg day1										
・ア*レ*ビ*タ*ン*カ*プ*セル80mg day2-3										
※デキサメタゾン注射液(day1)は4.95mgへ減量										
レジメンコメント(医師専用)										