

診療科 一般外科

分類 胃班

1 / 2

レジメンNo. 18-SG011

休薬期間 19日

最大回数 99回

レジメン名称 ★XP + Trastuzumab療法(2回目以降)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 167ml/h/180分かけて フィジオ140輸液 500ml	1瓶		01:00						
02	持続末梢静脈 維持ルートから 167ml/h/180分かけて フィジオ140輸液 500ml	1瓶		04:00						
03	持続末梢静脈 維持ルートから 167ml/h/180分かけて フィジオ140輸液 500ml	1瓶		07:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 30分かけて トラスツマブBS点滴静注用「150mg」[ハセブチン] 注射用水 20ml 生理食塩液7.5% (大塚) 250ml	6mg 2A 1袋	/kg	10:00						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/30分かけて アロキシ静注(0.75mg-5ml) デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デカトロン] デキサート注射液(1.65mg-0.5mL) [デカトロン] 生理食塩液PL (フソー) 100ml	1瓶 1瓶 2A 1瓶		10:30						
06	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/60分かけて 硫酸Mg補正液(20mEq-20ml) 生理食塩液PL (フソー) 100ml	1A 1瓶		11:00						
07	末梢静脈側管 点滴静注で 400ml/h/30分かけて マンニトールS 300ml	200ml		12:00						
08	末梢静脈側管 点滴静注で 250ml/h/120分かけて シスプラチン注<50mg-100mL>[プラチラチン] 生理食塩液PL (フソー) 500ml	80mg 1瓶	/m ²	12:30						
09	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		14:30						
10	持続末梢静脈 維持ルートから 200ml/h/150分かけて フィジオ140輸液 500ml	1瓶		14:30						
	続きあり									

レジメンコメント(医師専用)

診療科 一般外科

分類 胃班

2 / 2

レジメンNo. 18-SG011

休薬期間 19日

最大回数 99回

レジメン名称 ★XP + Trastuzumab療法(2回目以降)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
11	持続末梢静脈 維持ルートから 140ml/h/420分かけて ソルデム3A輸液 1000ml	1袋		17:00						
12	持続末梢静脈 維持ルートから 80 ml/h ソルデム3A輸液 1000ml	1袋			00:00					
終了										
レジメンNo.	18-SG011									
レジメン名称	★XP + Trastuzumab療法(2回目以降)									
レジメン参照情報										
【併用薬】										
・カベンタピン錠:1回1000mg/m ² 1日2回 day1夕～day15朝										
【併用薬(推奨)】										
・アプレビタントガセル:125mg 分1 day1										
・アプレビタントガセル: 80mg 分1 day2, 3										
・デキサメタゾン錠 : 8mg/日 day2-4										

レジメンコメント(医師専用)