

レジメンNo. 21-SG006

休薬期間 13日

最大回数 999回

レジメン名称 ★TEGAFIRI+Bevacizumab療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL（フソー） ルートキープ	100ml	1瓶	09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/30分かけて デキサート注射液(1.65mg-0.5mL) [デ'カ'ロン] デキサート注射液「6.6mg-2mL」 [デ'カ'ロン] パロノセトロン静注(0.75mg-5mL/V) [アロキシ] 生理食塩液PL（フソー） 50ml		2A 1% 1% 1瓶	09:30						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 90分かけて ベ'パ'シ'マ' BS点滴静注「400mg-16mL」 [ア'バ'スチン] 生理食塩液PL（フソー） 100ml 初回90分、2回目60分、3回目以降30分可、ポンプ使用		5mg /kg 1瓶	10:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 全開で 生理食塩液PL（フソー） 50ml		1瓶	11:30						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 90分かけて イリ'テ'カン塩酸塩点滴静注液「100mg-5mL」 [ト'ホ'テシ] 5% ブドウ糖注PL 500ml		150mg /ml 1瓶	11:40						
06	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL（フソー） 50ml フラッシュ		1瓶	13:10						
終了										

レジメンコメント(医師専用)

レジメン参照情報

【併用薬】

- ・UFT: 300-600mg/day 5 日内服 2 日休薬
- ・LV: 75mg/day 5 日内服 2 日休薬

【併用薬(推奨)】

- ・デキサメタゾン錠: 8mg day2-3

または

- ・アプレピタントカプセル: 125mg day1
 - ・アプレピタントカプセル: 80mg day2-3
- ※デキサメタゾン注射液(day1)は 4.95mg へ減量

【投与上の注意】

- ・1 サイクル 28 日。day1、day15 に投与。