

診療科 消化器内科

分類 膵癌・胆道癌

1 / 2

レジメンNo. 19-IA002

休薬期間 13日

最大回数 999回

レジメン名称 GEM+CDDP療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 500ml/h/60 分かけて 生理食塩液PL (フー) 500ml 硫酸Mg補正液 (20meq-20ml)	1瓶 1A		10:00						
02	持続末梢静脈 維持ルートから 500ml/h/120分かけて 生理食塩液バッグ (フー) 1000ml	1袋		11:00						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 全開で デキサート注射液「6.6mg-2mL」 [デ'カト'ロン] デキサート注射液 (1.65mg-0.5mL) [デ'カト'ロン] アロキシ静注 (0.75mg-5ml) 生理食塩液PL (フー) 100ml	1瓶 2A 1瓶 1瓶		10:40						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 400ml/h/30 分かけて マンニトールS 300ml	200ml		10:50						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 500ml/h/60 分かけて シスプラチン注 (10mg-20mL) [プ'リ'ラチン] 生理食塩液PL (フー) 500ml 薬剤注入量分、生食破棄。	25mg 1瓶	/m ²	11:20						
06	末梢静脈側管 点滴静注で 500ml/h/30 分かけて ゲムシタビン点滴静注液「1000mg-25mL」 [ジ'ェムザ'ール] 5% ブドウ糖液 250ml	1000mg 1袋	/m ²	12:20						
07	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フー) 50ml フラッシュ	1瓶		12:50						
続きあり										

レジメンコメント (医師専用)

診療科 消化器内科

分類 膵癌・胆道癌

2 / 2

レジメンNo. 19-IA002

休薬期間 13日

最大回数 999回

レジメン名称 GEM+CDDP療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 500ml/h/60 分かけて 生理食塩液PL(フー) 500ml 硫酸Mg補正液(20meq-20ml)	1瓶 1A		10:00						
02	持続末梢静脈 維持ルートから 500ml/h/120分かけて 生理食塩液バッグ(フー) 1000ml	1袋		11:00						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 全開で デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ ^カ ト ^ロ ン] デキサート注射液(1.65mg-0.5mL)[デ ^カ ト ^ロ ン] アロキシ静注(0.75mg-5ml) 生理食塩液PL(フソー) 100ml	1瓶 2A 1瓶 1瓶		10:40						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 400ml/h/30 分かけて マンニトールS 300ml	200ml		10:50						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 500ml/h/60 分かけて シスプラチン注(10mg-20mL)[プ ^リ ア ^ラ チン] 生理食塩液PL(フー) 500ml 薬剤注入量分、生食破棄。	25mg 1瓶	/m ²	11:20						
06	末梢静脈側管 点滴静注で 500ml/h/30 分かけて ゲムシタビン点滴静注液「1000mg-25mL」[ジ ^エ ム ^サ ー ^ル] 5% ブドウ糖液 250ml	1000mg 1袋	/m ²	12:20						
07	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		12:50						
— 終了 —										

レジメンコメント(医師専用)