

診療科 消化器内科

分類 膝癌・胆道癌

1 / 1

レジメンNo. 19-IA003

休薬期間 13日

最大回数 999回

レジメン名称 ★GEM+CDDP+S-1療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 500ml/h/60分かけて 生理食塩液PL(フー) 500ml 硫酸Mg補正液(20meq-20ml)	1瓶 1A		10:00						
02	持続末梢静脈 維持ルートから 500ml/h/120分かけて 生理食塩液バッグ(フー) 1000ml	1袋		11:00						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 全開で デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カト'ロン] デキサート注射液(1.65mg-0.5mL)[デ'カト'ロン] アロキシ静注(0.75mg-5ml) 生理食塩液PL(フー) 100ml	1瓶 2A 1瓶 1瓶		10:40						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 400ml/h/30分かけて マンニトールS 300ml	200ml		10:50						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 500ml/h/60分かけて シスプラチン注(10mg-20mL)[プ'リ'ラチン] 生理食塩液PL(フー) 500ml 薬剤注入量分、生食破棄。	25mg 1瓶	/m ²	11:20						
06	末梢静脈側管 点滴静注で 500ml/h/30分かけて ゲムシタビン点滴静注液「1000mg-25mL」[ジ'エム'サ'ール] 5%ブドウ糖液 250ml	1000mg 1袋	/m ²	12:20						
07	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フー) 50ml フラッシュ	1瓶		12:50						
終了										
レジメンNo.	19-IA003									
レジメン名称	★GEM+CDDP+S-1療法									
レジメン参照情報										
【併用薬】 ・S-1:80-120mg/day day1夕-day8朝										
【併用薬(推奨)】 ・デキサメタゾン:8mg/day day2-3										

レジメンコメント(医師専用)