

診療科 消化器内科

分類 膵癌・胆道癌

1 / 1

レジメンNo. 13-IA005

休薬期間 13日

最大回数 999回

レジメン名称 modified FOLFIRINOX療法（外来用）

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	点滴静注 抜き刺しで 生理食塩液PL（フソー） 100ml ルトキフ	100ml	1瓶	09:00						
02	点滴静注 抜き刺しで 100ml/h/30分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デカトロン] デキサート注射液(1.65mg-0.5mL)[デカトロン] アロキシ静注（0.75mg-5ml） 生理食塩液PL（フソー） 50ml		1% 2A 1% 1瓶	09:30						
03	点滴静注 抜き刺しで 125ml/h/120分かけて オキサリプラチン点滴静注液「100mg-20mL」[エルプラチ] 5%ブドウ糖液 250ml	85mg 1袋	/m ²	10:00						
04	点滴静注 抜き刺しで 125ml/h/120分かけて アイソボリン点滴静注用「100mg」 5%ブドウ糖液 250ml オキサリプラチン終了後、イリリカと同時に投与	200mg 1袋	/m ²	12:00						
05	点滴静注 抜き刺しで 90分かけて イリリカ塩酸塩点滴静注液「100mg-5mL」[イリリカ] 5%ブドウ糖液 250ml オキサリプラチン終了後、イリリカと同時に投与	150mg 1袋	/m ²	12:00						
06	点滴静注 抜き刺しで 全開で 生理食塩液PL（フソー） 50ml フラッシュ	1瓶		14:00						
07	点滴静注 抜き刺しで 2.5ml/h/46時間かけて 5-FU注（250mg-5mL） 5%ブドウ糖液 100ml 5%ブドウ糖液で合計115mlに。ハクスターインフューザー-SV2.5。	2400mg 1瓶	/m ²	14:10						
終了										

レジメンコメント(医師専用)