

診療科 消化器内科

分類 進行胃癌

1 / 2

レジメンNo. 11-1A006

休薬期間 17日

最大回数 1回

レジメン名称 トラスツマブ+X P療法（初回）

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 40 ml/h/9時～18時 ソルデム3A輸液 500mL [ソリタ3]	1袋		09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 500ml/h/60 分かけて 10% 塩化ナトリウム 20ml 5% ブドウ糖注PL 500ml	1A 1瓶		09:00						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 500ml/h/60 分かけて 10% 塩化ナトリウム 20ml 5% ブドウ糖注PL 500ml	1A 1瓶		10:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/60 分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」 [デカトロン] デキサート注射液(1.65mg-0.5mL) [デカトロン] 生理食塩液PL（フソー） 100ml	1瓶 2A 1瓶		10:00						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 500ml/h/60 分かけて 10% 塩化ナトリウム 20ml 5% ブドウ糖注PL 500ml	1A 1瓶		11:00						
06	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/60 分かけて アロキシ静注（0.75mg-5ml） 生理食塩液PL（フソー） 100ml	1瓶 1瓶		11:00						
07	末梢静脈側管 点滴静注で 90 分かけて トラスツマブ BS点滴静注用(60mg) [ハセブチン] 注射用水 20ml 生理食塩液ソリタ3（大塚） 250ml	8mg 2A 1袋	/kg	12:00						
08	末梢静脈側管 点滴静注で 250ml/h/120分かけて シスプラチン注<50mg-100mL> [プリプラチン] 生理食塩液PL（フソー） 500ml	80mg 1瓶	/m ²	13:30						
09	末梢静脈側管 点滴静注で 500ml/h/60 分かけて 10% 塩化ナトリウム 20ml 5% ブドウ糖注PL 500ml	1A 1瓶		15:30						
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 消化器内科

分類 進行胃癌

2 / 2

レジメンNo. 11-IA006

休薬期間 17日

最大回数 1回

レジメン名称 トラスツマブ+XP療法(初回)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
10	末梢静脈側管 点滴静注で 500ml/h/60 分かけて 10% 塩化ナトリウム 20ml 5% ブドウ糖注PL 500ml		1A 1瓶	16:30						
11	末梢静脈側管 点滴静注で 500ml/h/60 分かけて 10% 塩化ナトリウム 20ml 5% ブドウ糖注PL 500ml		1A 1瓶	17:30						
12	持続末梢静脈 維持ルートから 80 ml/h ソルデム3A輸液 500mL [ソリタ3]		1袋	18:00	18:00	18:00	18:00			
13	持続末梢静脈 維持ルートから 80 ml/h ソルデム3A輸液 500mL [ソリタ3]		1袋		00:00	00:00	00:00			
14	持続末梢静脈 維持ルートから 80 ml/h ソルデム3A輸液 500mL [ソリタ3]		1袋		06:00	06:00	06:00			
15	持続末梢静脈 維持ルートから 80 ml/h ソルデム3A輸液 500mL [ソリタ3]		1袋		12:00	12:00	12:00			
01	アブレピタントカプセル「125mg」[イメド [®] 1 分1:12時 シスプラチン投与1~1.5時間前に内服		C 1日分	●						
01	アブレピタントカプセル(80mg) [イメド [®] 1 分1:朝 食後		C 2日分		●	→				
02	デカドロン錠「4mg」 分1:朝 食後	2	T 3日分		●	→	→			
―― 終了 ――										
レジメンNo.	11-IA006									
レジメン名称	トラスツスマブ+XP療法(初回)									
レジメン参照情報										
【併用薬】 ・カヘンタヒン2000mg/m ² day1夕-day15朝										
【併用薬(推奨)】 ・アブレピタントカプセル:125mg day1 ・アブレピタントカプセル:80mg day2-3 ・デキサメタゾン錠8mg day2-4										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 消化器内科

分類 進行胃癌

1 / 2

レジメンNo. 11-IA007

休薬期間 17日

最大回数 5回

レジメン名称 トラスツマブ+X P療法(2回目以降)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	持続末梢静脈維持ルートから 40 ml/h/9時~18時 ソルデム3A輸液 500mL [ソルT3]	1袋		09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 500ml/h/60分かけて 10% 塩化ナトリウム 20ml 5% ブドウ糖注PL 500ml	1A 1瓶		09:00						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 500ml/h/60分かけて 10% 塩化ナトリウム 20ml 5% ブドウ糖注PL 500ml	1A 1瓶		10:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/60分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デカトロン] デキサート注射液(1.65mg-0.5mL)[デカトロン] 生理食塩液PL(フソー) 100ml	1瓶 2A 1瓶		10:00						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 500ml/h/60分かけて 10% 塩化ナトリウム 20ml 5% ブドウ糖注PL 500ml	1A 1瓶		11:00						
06	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/60分かけて アロキシ静注(0.75mg-5ml) 生理食塩液PL(フソー) 100ml	1瓶 1瓶		11:00						
07	末梢静脈側管 点滴静注で 500ml/h/30分かけて トラスツマブBS点滴静注用(60mg)[ハセブチン] 注射用水 20ml 生理食塩液ソトハツガ(大塚) 250ml	6mg 2A 1袋	/kg	12:00						
08	末梢静脈側管 点滴静注で 250ml/h/120分かけて シスプラチン注<50mg-100mL>[プリプラチン] 生理食塩液PL(フソー) 500ml	80mg 1瓶	/m ²	12:30						
09	末梢静脈側管 点滴静注で 500ml/h/60分かけて 10% 塩化ナトリウム 20ml 5% ブドウ糖注PL 500ml	1A 1瓶		14:30						
	続きあり									

レジメンコメント(医師専用)

診療科 消化器内科

分類 進行胃癌

2 / 2

レジメンNo. 11-IA007

休薬期間 17日

最大回数 5回

レジメン名称 トラスツマブ+XP療法(2回目以降)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
10	末梢静脈側管 点滴静注で 500ml/h/60 分かけて 10% 塩化ナトリウム 20ml 5% ブドウ糖注PL 500ml		1A 1瓶	15:30						
11	末梢静脈側管 点滴静注で 500ml/h/60 分かけて 10% 塩化ナトリウム 20ml 5% ブドウ糖注PL 500ml		1A 1瓶	16:30						
12	持続末梢静脈 維持ルートから 80 ml/h ソルデム3A輸液 500mL [ソリタ3]		1袋	18:00	18:00	18:00	18:00			
13	持続末梢静脈 維持ルートから 80 ml/h ソルデム3A輸液 500mL [ソリタ3]		1袋		00:00	00:00	00:00			
14	持続末梢静脈 維持ルートから 80 ml/h ソルデム3A輸液 500mL [ソリタ3]		1袋		06:00	06:00	06:00			
15	持続末梢静脈 維持ルートから 80 ml/h ソルデム3A輸液 500mL [ソリタ3]		1袋		12:00	12:00	12:00			
01	アプレピタントカプセル「125mg」[イメド] 1 分1: 11時 シスプラチン投与1~1.5時間前に服用		C 1日分	●						
01	アプレピタントカプセル(80mg) [イメド] 1 分1: 朝 食後		C 2日分		●	→				
02	デカドロン錠「4mg」 分1: 朝 食後	2	T 3日分		●	→	→			
終了										
レジメンNo.	11-IA007									
レジメン名称	トラスツマブ+XP療法(2回目以降)									
レジメン参照情報										
【併用薬】 ・カベンタビン2000mg/m ² day1夕-day15朝										
【併用薬(推奨)】 ・アプレピタントカプセル:125mg day1 ・アプレピタントカプセル:80mg day2-3 ・デキサメタゾン錠8mg day2-4										

レジメンコメント(医師専用)