

診療科 消化器内科

分類 食道癌(胃癌)

2021/11/26 09:10

1 / 2

レジメンNo. 21-1A006

休薬期間 13日

最大回数 999回

レジメン名称 ★FTD/TPI+Ramucirumab療法

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント                                                                                                     | 1回投与量         | 速度指示 | day ( 1 ) | day ( 2 ) | day ( 3 ) | day ( 4 ) | day ( 5 ) | day ( 6 ) | day ( 7 ) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01   | 持続末梢静脈 維持ルートから<br>生理食塩液P L (フソー) 100m l<br>ルートキープ                                                               | 1瓶            |      | 09:15     |           |           |           |           |           |           |
| 02   | 末梢静脈側管 点滴静注で<br>15 分かけて<br>ボララミン (5mg)<br>生理食塩液P L (フソー) 100m l                                                 | 2A<br>1瓶      |      | 09:45     |           |           |           |           |           |           |
| 03   | 末梢静脈側管 点滴静注で<br>60 分かけて<br>サイラムザ点滴静注液「500mg-50mL」<br>生理食塩液ソトハッグ(大塚) 250m l<br>2回目以降30分可、薬剤注入量分生食破棄、インラインフィルタ-使用 | 8mg /kg<br>1袋 |      | 10:00     |           |           |           |           |           |           |
| 04   | 末梢静脈側管 点滴静注で<br>生理食塩液P L (フソー) 50m l<br>フラッシュ                                                                   | 1瓶            |      | 11:00     |           |           |           |           |           |           |
| 続きあり |                                                                                                                 |               |      |           |           |           |           |           |           |           |

レジメンコメント(医師専用)

診療科 消化器内科

分類 食道癌(胃癌)

2021/11/26 09:10

2 / 2

レジメンNo. 21-IA006

休薬期間 13日

最大回数 999回

レジメン名称 ★FTD/TPI+Ramucirumab療法

| RpNo     | 薬剤名/手技/コメント                                                                                                   | 1回投与量 | 速度指示          | day(15) | day(16) | day(17) | day(18) | day(19) | day(20) | day(21) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 01       | 持続末梢静脈 維持ルートから<br>生理食塩液PL(フソー) ルートキープ                                                                         | 100ml | 1瓶            | 09:15   |         |         |         |         |         |         |
| 02       | 末梢静脈側管 点滴静注で<br>15分かけて<br>ポララミン(5mg)<br>生理食塩液PL(フソー)                                                          | 100ml | 2A<br>1瓶      | 09:45   |         |         |         |         |         |         |
| 03       | 末梢静脈側管 点滴静注で<br>60分かけて<br>サイラムザ点滴静注液「500mg-50mL」<br>生理食塩液ソトパック(大塚) 250ml<br>2回目以降30分可、薬剤注入量分生食破棄、インラインフィルター使用 |       | 8mg /kg<br>1袋 | 10:00   |         |         |         |         |         |         |
| 04       | 末梢静脈側管 点滴静注で<br>生理食塩液PL(フソー) フラッシュ                                                                            | 50ml  | 1瓶            | 11:00   |         |         |         |         |         |         |
| —— 終了 —— |                                                                                                               |       |               |         |         |         |         |         |         |         |

レジメンコメント(医師専用)

## レジメン参照情報

### 【併用薬】

・FTD/TPI: 70-150mg/day day1-5,8-12

### 【投与上の注意】

・1 サイクル 28 日。day1、day15 に投与。