

診療科 整形外科		分類 軟部肉腫		1 / 2						
レジメンNo. 16-0P001		休薬期間 13日		最大回数 999回						
レジメン名称 Eribulin療法										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	点滴静注 抜き刺しで 生理食塩液PL(フソー) 100ml ルトキープ	1瓶		09:30						
02	点滴静注 抜き刺しで 2~5分かけて ハラヴェン静注(1mg-2ml) 生理食塩液PL(フソー) 50ml	1.4mg 20ml	/m ²	10:00						
03	点滴静注 抜き刺しで 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		10:05						
続きあり										
レジメンコメント(医師専用)										

診療科 整形外科

分類 軟部肉腫

2 / 2

レジメンNo. 16-0P001

休薬期間 13日

最大回数 999回

レジメン名称 Eribulin療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
01	点滴静注 抜き刺しで 生理食塩液PL（フソー） ルトキープ	100ml	1瓶	09:30						
02	点滴静注 抜き刺しで 2～5分かけて ハラヴェン静注（1mg－2ml） 生理食塩液PL（フソー）	1.4mg 20ml	/m ²	10:00						
03	点滴静注 抜き刺しで 生理食塩液PL（フソー） フラッシュ	50ml	1瓶	10:05						
―― 終了 ――										

レジメンコメント(医師専用)