

診療科 整形外科 分類 骨肉腫(再発)

1 / 3

レジメンNo. 10-0P005

休薬期間 17日

最大回数 999回

レジメン名称 アドリアマイシン単独療法 (A3療法) : NEC095J

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 250ml/h/120分かけて ソルデム1輸液 500mL [ソリタ1]	1袋		07:00						
02	持続末梢静脈 維持ルートから 100ml/h ソルデム3A輸液 1000ml 強力ネオミノファーゲンシーP 静注(20ml)	1袋 1A		09:30						
03	持続末梢静脈 維持ルートから 100ml/h ソルデム3A輸液 1000ml 強力ネオミノファーゲンシーP 静注(20ml)	1袋 1A		19:30						
04	末梢静脈側管 維持ルートから 200ml/h/30分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」 [デカドロン] グラニセトロン静注液 (3mg-3mL) [カイトリル] 生理食塩液PL (フソー) 100ml	1瓶 1A 1瓶		09:30						
05	末梢静脈側管 維持ルートから 10 ml/h/24時間かけて アドリアシン注用「50mg」 生理食塩液ソリタバッグ (大塚) 250ml アドリアシン25~30mg/m ²	25mg 240ml	/m ²	10:00						
06	末梢静脈側管 維持ルートから 200ml/h/30分かけて フロセミド注射液(20mg-2mL) [ラシックス] 生理食塩液PL (フソー) 100ml	1A 1瓶		14:00						
07	持続末梢静脈 維持ルートから 100ml/h ソルデム3A輸液 1000ml 強力ネオミノファーゲンシーP 静注(20ml)	1袋 1A			00:00					
08	持続末梢静脈 維持ルートから 100ml/h ソルデム3A輸液 1000ml 強力ネオミノファーゲンシーP 静注(20ml)	1袋 1A			10:00					
09	末梢静脈側管 維持ルートから 200ml/h/30分かけて グラニセトロン静注液 (3mg-3mL) [カイトリル] 生理食塩液PL (フソー) 100ml	1A 1瓶			09:30					
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

レジメンNo. 10-0P005

休薬期間 17日

最大回数 999回

レジメン名称 アドリアマイシン単独療法 (A3療法) : NEC095J

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
10	末梢静脈側管 維持ルートから 10 ml/h/24時間かけて アドリアシン注用「50mg」 生理食塩液ワトバック(大塚) 250ml アドリアシン25~30mg/m ²	25mg 240ml	/m ²		10:00					
11	末梢静脈側管 維持ルートから 200ml/h/30分かけて フロセミド注射液(20mg-2ml) [ラシックス] 生理食塩液PL (フソー) 100ml	1A 1瓶			14:00					
12	持続末梢静脈 維持ルートから 100ml/h ソルデム3A輸液 1000ml 強力ネオミノファージェンシーP 静注(20ml)	1袋 1A			20:00					
13	持続末梢静脈 維持ルートから 100ml/h ソルデム3A輸液 1000ml 強力ネオミノファージェンシーP 静注(20ml)	1袋 1A				00:00				
14	持続末梢静脈 維持ルートから 100ml/h ソルデム3A輸液 1000ml 強力ネオミノファージェンシーP 静注(20ml)	1袋 1A				10:00				
15	末梢静脈側管 維持ルートから 200ml/h/30分かけて グラニセトロン静注液(3mg-3ml) [カイトリル] 生理食塩液PL (フソー) 100ml	1A 1瓶				09:30				
16	末梢静脈側管 維持ルートから 10 ml/h/24時間かけて アドリアシン注用「50mg」 生理食塩液ワトバック(大塚) 250ml アドリアシン25~30mg/m ²	25mg 240ml	/m ²			10:00				
17	末梢静脈側管 維持ルートから 200ml/h/30分かけて フロセミド注射液(20mg-2ml) [ラシックス] 生理食塩液PL (フソー) 100ml	1A 1瓶				14:00				
18	持続末梢静脈 維持ルートから 100ml/h ソルデム3A輸液 1000ml 強力ネオミノファージェンシーP 静注(20ml)	1袋 1A				20:00				
	続きあり									

レジメンコメント(医師専用)

診療科 整形外科

分類 骨肉腫(再発)

3 / 3

レジメンNo. 10-0P005

休薬期間 17日

最大回数 999回

レジメン名称 アドリアマイシン単独療法(A3療法):NEC095J

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
19	持続末梢静脈維持ルートから 100ml/h ソルデム3A輸液 1000ml 強力ネオミノファーゲンシーP静注(20ml)	1袋 1A					00:00			
20	末梢静脈側管維持ルートから 200ml/h/30分かけて グラニセトロン静注液(3mg-3mL)[カイトル] 生理食塩液PL(フソー) 100ml	1袋 1A					09:30			
21	持続末梢静脈維持ルートから 100ml/h/16時終了 ソルデム3A輸液 1000ml 強力ネオミノファーゲンシーP静注(20ml)	1袋 1A					10:00			
01	アプレピタントカプセル「125mg」[イメド] 1 アドリアシンの60~90分前に投与 分1:朝 食後	C	1日分	●						
02	アプレピタントカプセル(80mg)[イメド] 1 分1:朝 食後	C	2日分	●	→					
終了										

レジメンコメント(医師専用)