

診療科 乳癌外科

分類 early breast cancer

1 / 1

レジメンNo. 15-SB001

休薬期間 13日

最大回数 4回

レジメン名称 dose-dense EC

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL (フソー) 100ml ルートキープ	100ml	1瓶	09:50						
02	持続末梢静脈 維持ルートから 100ml/h/30分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カト'ロン] デキサート注射液(1.65mg-0.5mL)[デ'カト'ロン] 生理食塩液PL (フソー) 50ml		1瓶 2A 1瓶	10:20						
03	持続末梢静脈 維持ルートから 300ml/h/10分かけて アロキシ静注(0.75mg-5ml) 生理食塩液PL (フソー) 50ml		1瓶 1瓶	10:50						
04	持続末梢静脈 維持ルートから 300ml/h/10分かけて E'ル'シ'ン塩酸塩注射用「50mg」[ファル'E'ル'シ'ン] 5%ブドウ糖液 50ml		90mg 1瓶	11:00						
05	持続末梢静脈 維持ルートから 200ml/h/30分かけて 注射用エンドキサン「500mg」 生理食塩液PL (フソー) 100ml		600mg 1瓶	11:10						
06	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL (フソー) 50ml フラッシュ		1瓶	11:40						
終了										

レジメンコメント(医師専用)