

診療科 乳腺外科

分類 MBC (Pertuzumab)

1 / 2

レジメンNo. 17-SB016

休薬期間 13日

最大回数 1回

レジメン名称 Eribulin+Pertuzumab+Trastuzumab療法 (初回)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液 PL (フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		09:30						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 250ml/h/60 分かけて パージェタ点滴静注(420mg-14ml) 生理食塩液リフトハック(大塚) 250ml	840mg 1袋	/Body	10:00						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 50 ml/h/60 分かけて 生理食塩液 PL (フソー) 50ml	1瓶		11:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 90 分かけて トラスツマブ BS点滴静注用(60mg) [ハセブチン] 注射用水 20ml 生理食塩液リフトハック(大塚) 250ml 8mg/kg。	8mg 2A 1袋	/kg	12:00						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 50 ml/h/60 分かけて 生理食塩液 PL (フソー) 50ml	1瓶		13:30						
06	末梢静脈側管 点滴静注で 2~5分かけて ハラヴェン静注(1mg-2ml) 生理食塩液 PL (フソー) 50ml	1.4mg 20ml	/m ²	14:30						
07	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液 PL (フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		14:35						
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 乳腺外科	分類 MBC (Pertuzumab)	2 / 2
レジメンNo. 17-SB016	休薬期間 13日	最大回数 1回
レジメン名称 Eribulin+Pertuzumab+Trastuzumab療法 (初回)		

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液 P L (フソー) 100ml ルートキープ		1瓶	09:30						
06	末梢静脈側管 点滴静注で 2～5分かけて ハラヴェン静注 (1mg - 2ml) 生理食塩液 P L (フソー) 50ml		1.4mg /m ² 20ml	10:00						
07	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液 P L (フソー) 50ml フラッシュ		1瓶	10:05						
終了										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 乳腺外科

分類 MBC (Pertuzumab)

1 / 2

レジメンNo. 17-SB017

休薬期間 13日

最大回数 99回

レジメン名称 Eribulin+Pertuzumab+Trastuzumab療法 (2回目以降)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL (フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		09:30						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 500ml/h/30 分かけて パージェタ点滴静注(420mg-14ml) 生理食塩液ソトパック (大塚) 250ml	420mg 1袋	/Body	10:00						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/30 分かけて 生理食塩液PL (フソー) 50ml	1瓶		10:30						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 500ml/h/30 分かけて トラスツマブBS点滴静注用(60mg) [ハセブチン] 注射用水 20ml 生理食塩液ソトパック (大塚) 250ml 6mg/kg。	6mg 2A 1袋	/kg	11:00						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/30 分かけて 生理食塩液PL (フソー) 50ml	1瓶		11:30						
06	末梢静脈側管 点滴静注で 2~5分かけて ハラヴェン静注 (1mg-2ml) 生理食塩液PL (フソー) 50ml	1.4mg 20ml	/m ²	12:00						
07	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		12:05						
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 乳腺外科

分類 MBC (Pertuzumab)

2 / 2

レジメンNo. 17-SB017

休薬期間 13日

最大回数 99回

レジメン名称 Eribulin+Pertuzumab+Trastuzumab療法 (2回目以降)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液 P L (フソー) 100ml ルートキープ		1瓶	09:30						
06	末梢静脈側管 点滴静注で 2～5分かけて ハラヴェン静注 (1mg-2ml) 生理食塩液 P L (フソー) 50ml		1.4mg /m ² 20ml	10:00						
07	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液 P L (フソー) 50ml フラッシュ		1瓶	10:05						
終了										

レジメンコメント(医師専用)