

診療科 乳腺外科		分類 early breast cancer		1 / 1						
レジメンNo. 09-SB009		休薬期間 20日		最大回数 6回						
レジメン名称 TC療法										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL(フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		00:00						
02	持続末梢静脈 維持ルートから 100ml/h/30 分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デカトロン] グラニセトロン静注液(3mg-3mL)[カイトリル] 生理食塩液PL(フソー) 50ml	1瓶 1A 1瓶		00:00						
03	持続末梢静脈 維持ルートから 250ml/h/60 分かけて ドセタキセル点滴静注「80mg-4mL」[タキセル] 5%ブドウ糖液 250ml 60~75mg/m2	75mg 1袋	/m2	00:00						
04	持続末梢静脈 維持ルートから 200ml/h/30 分かけて 注射用エンドキサン「500mg」 生理食塩液PL(フソー) 100ml	600mg 1瓶	/m2	00:00						
05	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		00:00						
―― 終了 ――										
レジメンコメント(医師専用)										